

Gäller för: Operation NÄL

Innehållsansvar: Anna Wallenius, (anngu119), Specialistläkare

Godkänd av: Lars Brühne, (larbr6), Överläkare

Giltig från: 2026-03-10

Giltig till: 2028-03-09

TVT, TVT-O - Anestesimetod

Revidering i denna version

Ingen revidering.

Bakgrund

TVT (tension-free vaginal tape) är ett band som opereras in under urinröret för att behandla ansträngningsinkontinens.

Syfte

Enhetlig rutin för omhändertagande av patienter vid dessa ingrepp.

Vilka berörs

Anestesi- och operationssjuksköterskor, anestesiläkare och undersköterskor på Operation, NÄL.

Innehåll och metodbeskrivning

Premedicinering

T Alvedon® (paracetamol) 1 g. Undvik T OxyContin® (oxykodon) och T Postafen® (meklozin) på dessa patienter pga att det kan påverka blåstömning.

Anestesiförslag

Lokalanestesi och sedering med Rapifen® (alfentanil) och Propofol, ge O2 på grimma. Börja med ex Rapifen® 0,5 mg samt en liten dos Propofol innan LA ges. Detta kan upprepas innan tunneleringen och under ingreppet. OBS: sedera inte för djupt eftersom operatören måste få en indikation om tunneleringen inte kommer rätt.

Övervakning

Standard (noninvasivt BT, EKG, pulsoxymetri, andningsfrekvens).

Blodgruppering/bastest

Nej/nej.

Praktiska råd

Sätt ingen vätska eftersom det kan leda till för snabb blåsfyllnad.

Operationsbord/läge

Unibord med skålar. Båda armarna på armbord.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Operation NÄL

Innehållsansvar: Anna Wallenius, (anngu119), Specialistläkare

Godkänd av: Lars Brühne, (larbr6), Överläkare

Dokument-ID: NU10093-1252922689-73

Version: 8.0

Giltig från: 2026-03-10

Giltig till: 2028-03-09