

Gäller för: Operation Uddevalla sjukhus

Giltig från: 2026-06-10

Innehållsansvar: Elin Handfast, (eliol24), Sektionsledare

Giltig till: 2028-06-10

Granskad av: Johanna Fällén, (johfa11), Överläkare

Godkänd av: Jimmy Bjelkengren, (jimbj), Verksamhetschef

Adenomenucleation av prostata - öppen

Revidering i denna version:

Ingen ändring.

Bakgrund

Operationen görs på patienter med benign prostataförstoring, för stor för P-tur operation dvs>100cc (normal prostata är ca 15 cc).

Den ursprungliga prostatan lämnas kvar, endast adenomet tas bort.

Syfte

Att skapa ett dokumentstöd för omhändertagande av patient vid öppen adenomenucleation.

Vilka berörs

Anestesisjuksköterskor, anestesiläkare och undersköterskor, Operation NU-sjukvården

Anestesi

Anestesikort: Intub/DFE - Sevo/luft. EDA

Aktivera epiduralen senast en timma innan operationens slut.

Utrustning

Standard. V- sond, Fluido, KAD sätts sterilt av operationssköterskan, patientvärmare, örontemp, blod/vätskevärmare, grova PVK, artärnål.

Blodgruppering/bastest

Ja/ja

Operationsbord/läge

Standardbord

Planläge. Vinkla operationsbordet över symfysen innan patienten sterilkläds, placera en kudde under knäna. Kontrollera att benremmen ej sitter för hårt. Återställ vinklingen innan operatören syr igen.

Håravkortning

Hela buken till och med skrotum.

Mobilisering/massage

Kontrollera uppläggningsen av patienten fortlöpande och massera armar och ben.

Risker

Var beredd på stora blödningar.

Avslutning/Postoperativt

Patientvärmare kvar tills patienten lämnar op-salen.

Patienten får suprapubiskateter + KAD + spoldropp som ska aktiveras innan transport till UVA och får inte stängas av.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Operation Uddevalla sjukhus

Innehållsansvar: Elin Handfast, (eliol24), Sektionsledare

Granskad av: Johanna Fällén, (johfa11), Överläkare

Godkänd av: Jimmy Bjelkengren, (jimbj), Verksamhetschef

Dokument-ID: NU10093-1252922689-81

Version: 9.0

Giltig från: 2026-06-10

Giltig till: 2028-06-10