

Gäller för: Operation Uddevalla sjukhus

Giltig från: 2025-08-18

Innehållsansvar: Johanna Fällén, (johfa11), Överläkare

Giltig till: 2027-08-18

Granskad av: Johanna Fällén, (johfa11), Överläkare

Godkänd av: Jimmy Bjelkengren, (jimbj), Verksamhetschef

Buscopan vid urologiska ingrepp

Förändringar sedan föregående version

Ingen revidering

Syfte

Behandlingsstöd för att minska risken för urogenital spasmsmärta.

Bakgrund

Vid ingrepp inom bl.a. urologi kan patienten få en överaktivitet i glatt muskulatur resulterande i en spasm i urogenitala området. Spasmen är smärtsam, och opioider har

ingen eller ringa effekt. Problemet är relativt vanligt vid ingrepp som RALP och RASP, varför profylaktisk behandling är av värde.

Dosering

40 mg Buscopan sätts till 100 ml NaCl. Infunderas på ca 30 min mot slutet av operationen.

Infusionen ska vara klar innan väckning påbörjas.

Vid otillräcklig effekt efter att patienten kommit till UVA, kan ytterligare 20-40 mg infunderas

Biverkningar och försiktighet

Vanlig biverkan är takykardi, och försiktighet rekommenderas vid hjärt-kärlsjukdomar - takykardi kan förvärra besvären.

Sänkning av infusionshastigheten har oftast effekt på takykardin. Om inte, får infusionen avbrytas.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Operation Uddevalla sjukhus

Innehållsansvar: Johanna Fällén, (johfa11), Överläkare

Granskad av: Johanna Fällén, (johfa11), Överläkare

Godkänd av: Jimmy Bjelkengren, (jimbj), Verksamhetschef

Dokument-ID: NU10093-645455372-264

Version: 2.0

Giltig från: 2025-08-18

Giltig till: 2027-08-18