

Gäller för: Operation Uddevalla sjukhus

Innehållsansvar: Elin Handfast, (eliol24), Sektionsledare

Granskad av: Johanna Fällén, (johfa11), Överläkare

Godkänd av: Jimmy Bjelkengren, (jimbj), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-12-09

Giltig till: 2027-12-09

# Robotassisterad THT – rectus diastas

---

## Revidering i denna version

Ny rutin

## Bakgrund

Abdominell rektusmuskeldiastas innebär en uttänjning av linea alba med ökat avstånd mellan de raka bukmusklerna och genom operation återställs den raka magmuskelnns ursprungliga läge.

## Syfte

Att skapa goda och säkra rutiner för omhändertagande av patient vid robotassisterad ljumskbråcksoperation.

## Vilka berörs

All personal Operation Nu-sjukvården

## Premedicinering

Alvedon 1g, Targiniq 10mg, Arcoxia 120mg (om inga kontraindikationer)

## Anestesiförslag

Anestesikort: Intub: Ultiva/Sevofluran/Esmeron alt

Intub: Ultiva/Propfol/Esmeron

Robinul

Ondansetron

Betapred, 2ml  
Catapresan

Oxynorm

PONV-profylax  
Sugammadex vb  
Ev läggs TAP-blockad av operatör

## Utrustning

Standard, TOF, patientvärmare, V-sond på indikation – sonda pre- och postoperativt om v-sond inte används.

## Blodgruppering/Bastest

Ja/ Nej

## Förberedelser

Tvättning från bröstben ned till symfys, samt brett ut med sidorna (där lägger operatören blockad).

Urinkateter sätts på förberedelserummet.

## Praktiska råd

PVK i hö arm. Blodtrycksmanschett vä arm. Oraltub tejpas i hö mungipa.

Kontrollera att operationsbordet är låst innan operationsstart. Sätt kontrollen till bordet i väggen under operationen. Insufflerad koldioxid kan ge stigande EtCO<sub>2</sub> vid behov öka ventilationen.

Patienten måste vara väl muskelrelaxerad. Ge muskelrelaxantia innan operationsstart och om patienten stiger i TOF.

Använd ögonförband t.ex. Cornea Care.

## Positionering

### Patient

Armbord x 1 hö-sida, vä arm längs med sidan - inbäddad, antiglidmadrass, benrem (ej för hårt satt). Placera patienten så att operationsbordsleden hamnar vid höften. Benen tippas neråt och hela bordet tippas i trendelenburg.

## Operationsbord

Standardbord med fyrdelat benstöd.

## Risker

Konvertering till öppen kirurgi vid operationstekniskt svåra förhållanden. Patienten får inte röras/ förflyttas medan roboten är dockad till portarna. Placera fjärrkontroll i vägghållaren under operationen. Operationsbordet måste vara låst.

## Avslutning/postoperativt

Då patienten skall vara väl muskelrelaxerad perioperativt, bör Sugammadex övervägas.

Sätt på gördel.

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Operation Uddevalla sjukhus

**Innehållsansvar:** Elin Handfast, (eliol24), Sektionsledare

**Granskad av:** Johanna Fällén, (johfa11), Överläkare

**Godkänd av:** Jimmy Bjelkengren, (jimbj), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** NU10093-645455372-301

**Version:** 1.0

**Giltig från:** 2025-12-09

**Giltig till:** 2027-12-09