

Gäller för: Vuxenpsykiatri

Giltig från: 2025-05-08

Innehållsansvar: Désirée Ricken, (dsiri1), Sektionschef

Giltig till: 2027-05-08

Granskad av: Désirée Ricken, (dsiri1), Sektionschef

Godkänd av: Viktoria Skeie, (vicsk), Verksamhetschef

PM för provtagning av patienter med neuroleptikabehandling

- Vikt en gång i månaden
- Vid användning av följande preparat: Clozapine (se separat rutin [Clozapine, insättning/uppföljning av behandling](#)) och Zyprexa tas B-Glukos 1ggr /månad
- När patienten sätts in på Xeplion, Invega eller Risperdal tas ett utgångsvärde på Prolaktin och uppföljning efter tre månader. Därefter Prolaktinprover enligt ordination. **Observera** att Prolaktin tas två timmar efter uppvaknande!
- Övrig neuroleptika: Prolaktin första gången som utgångsvärde, därefter endast enligt läkarordination.
- Vid användning av övriga neuroleptikapreparat tas följande prover var 4:de månad;
 - B-Glukos
 - HbA1C
 - Kolesterol HDL/LDL
 - Triglycerider
- Vikt dokumenteras under mätvärde i Melior. Provtagningar enligt PM dokumenteras under Planering/provtagning i Melior. Information om provtagningsresultat skall lämnas till läkaren.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Vuxenpsykiatri

Innehållsansvar: Désirée Ricken, (dsiri1), Sektionschef

Granskad av: Désirée Ricken, (dsiri1), Sektionschef

Godkänd av: Viktoria Skeie, (vicsk), Verksamhetschef

Dokument-ID: NU10094-1226863795-178

Version: 2.0

Giltig från: 2025-05-08

Giltig till: 2027-05-08