OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Gäller för: Radiologisk mottagning NÄL, Radiologisk mottagning Uddevalla Sjukhus
Innehållsansvar: Ann-Christine Frendius, (annan83), Överläkare
Godkänd av: Carl Hansen, (carha61), Enhetschef
Giltig från: 2026-12-31
Giltig till: 2028-09-15

Aspiration av kontrastmedel i lungorna

Sammanfattning/Syfte

Rutin för åtgärder vid misstanke om risk för aspiration/läckage vid röntgenundersökning.

Förändringar sedan föregående version

Inga förändringar.

Åtgärder

Vid misstanke om risk för aspiration/läckage vid undersökningen:

- Vattenlöslig kontrast bör användas.

Vid aspiration:

- Så fort man upptäcker aspiration eller kontrast i luftvägarna avbryts undersökningen.
- Undersökningen kompletteras med röntgen av lungor, frontalbild, för att bedöma utbredningen och mängden av kontrast i luftvägarna.
  Vid behov tas även sidobild.
- Kontakta akuten (för NÄL) eller narkosjour/medicinjour (för Uddevalla) om patienter remitterade från primärvården aspirerat en större mängd kontrast.
- Remittenten informeras om patientens tillstånd och det inträffade.

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Radiologisk mottagning NÄL, Radiologisk mottagning Uddevalla Sjukhus

Innehållsansvar: Ann-Christine Frendius, (annan83), Överläkare

Godkänd av: Carl Hansen, (carha61), Enhetschef

Dokument-ID: NU10095-1819752655-100

Version: 14.0

Giltig från: 2026-12-31

Giltig till: 2028-09-15