

Gäller för: Radiologisk mottagning NÄL, Radiologisk mottagning Uddevalla Sjukhus

Giltig från: 2025-08-21

Innehållsansvar: Sanna Axelsson, (sanpa5), Sektionsledare

Giltig till: 2027-08-21

Godkänd av: Marianna Fehér, (marfe24), Överläkare

## Buköversikt – Sondläge

### Metodbok Konventionell röntgen

Gemensam rutin för att utföra undersökning på ett säkert och enhetligt sätt.

### Förändringar sedan föregående version

Inga förändringar.

### Inför undersökningen

<b>Frågeställning</b>	Sondläge
<b>Strålskydd</b>	Kvinnor mellan 15–50 år ska tillfrågas om eventuell graviditet.  För övriga strålskyddsregler se kapitel 4.2 och 5.1 i <a href="#">Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning</a>
<b>Arbetsplats</b>	Adora T3 Avdelning/bedside
<b>Detektor</b>	Potter med raster <i>alternativt</i> Stor detektor med raster
<b>Bildtagning</b>	1. Frontal – liggande
<b>Övrigt</b>	Sonderna är oftast röntgentäta.  Vid icke röntgentät sond eller om den syns dåligt på bilden ordinerar röntgenläkare kontrast Omnipaque 240 mg I/ml, 10–20 ml som sprutas i katetern.

## Bildtagning

### Frontal – liggande

Övre delen av buken.

Patienten ska hålla andan.

#### Kriterier

Diafragma med på bilden.

### Frontal liggande



### Frontal liggande med kontrast



# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Radiologisk mottagning NÄL, Radiologisk mottagning  
Uddevalla Sjukhus

**Innehållsansvar:** Sanna Axelsson, (sanpa5), Sektionsledare

**Godkänd av:** Marianna Fehér, (marfe24), Överläkare

**Dokument-ID:** NU10095-1819752655-127

**Version:** 6.0

**Giltig från:** 2025-08-21

**Giltig till:** 2027-08-21