

Gäller för: Radiologisk mottagning NÄL, Radiologisk mottagning Uddevalla Sjukhus

Giltig från: 2025-09-02

Innehållsansvar: Peter Nilsson, (petni10), Överläkare

Giltig till: 2027-09-02

Godkänd av: Peter Nilsson, (petni10), Överläkare

# Premedicinering inför MR-undersökning

## Bakgrund

Rutin för patienter som inte klarar av att genomföra en MR-undersökning utan lugnande medicinering.

## Förändringar sedan föregående version

Inga förändringar.

## Sammanfattning/syfte

Kriterier för att genomföra MR-undersökning med hjälp av lugnande medicinering.

## Åtgärder

1. Patienten bör prova att utföra undersökningen innan premedicinering ges.
2. Om patienten inte klarar av att genomföra undersökningen och lugnande medicinering måste ges är det viktigt att dessa kriterier följs;
  - Vid premedicinering krävs att patienten har medföljande sällskap närvarande på avdelningen. Patienten får ej köra bil resten av dagen efter att ha fått lugnande medicinering.
  - Patienten får inte ha påbörjat egen medicinering hemma.
  - Kontrollera om patienten äter några mediciner.
  - Om patienten tagit något lugnande läkemedel eller psykofarmaka (t ex antidepressiva läkemedel) innan undersökningen rådfrågas radiolog.
  - Var restriktiv vid hög ålder, hjärtsjukdom eller förvirringstillstånd.
  - Rådfråga alltid radiolog vid eventuell tveksamhet.
  - Rådfråga alltid radiolog då det gäller barn.
  - Inneliggande patienter ges och ordineras lugnande medicinering av respektive avdelning.

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Radiologisk mottagning NÄL, Radiologisk mottagning  
Uddevalla Sjukhus

**Innehållsansvar:** Peter Nilsson, (petni10), Överläkare

**Godkänd av:** Peter Nilsson, (petni10), Överläkare

**Dokument-ID:** NU10095-1819752655-29

**Version:** 11.0

**Giltig från:** 2025-09-02

**Giltig till:** 2027-09-02