

Gäller för: Radiologisk mottagning NÄL, Radiologisk mottagning Uddevalla Sjukhus

Giltig från: 2025-09-16

Innehållsansvar: Karin Nyberg, (karny7), Röntgensjuksköterska

Giltig till: 2027-09-16

Godkänd av: Carl Hansen, (carha61), Enhetschef

Komplettering med DT Kolon efter ofullständig koloskopi

Vid ofullständig koloskopi och där koloskoperande läkare önskar komplettera med DT Kolon gäller följande:

Eventuella kontraindikationer

- Har patienten kolostomi ska röntgenavdelningen meddelas detta innan remissen skickas.
- Vid lågt sittande tumörer (nedom 10-12 cm), i synnerhet cirkumferenta sådana, bör man överväga att avstå DT Kolon. Kontakta radiolog för diskussion.
- Efter polypektomi eller mukosektomi måste man vänta cirka 3 veckor innan DT Kolon kan utföras.

Förberedelser inför undersökningen

- Patienten ska vara väl laxerad.
- Ring till:
- **NÄL:** koordinator datortomografi 010-43 529 06
- Alternativt **Uddevalla:** datortomografen 010-43 526 71 eller slussen 010-43 526 80
- Skriv akutmärkt remiss för DT Kolon.
- Kreatininvärde måste finnas tillgängligt innan undersökning.
- Patienten får dricka klar dryck fram till undersökningstiden.

Utförande avdelning

I första hand utförs undersökningen på NÄL, finns det ingen möjlighet att utföra undersökningen där kontakta Uddevalla sjukhus.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Radiologisk mottagning NÄL, Radiologisk mottagning
Uddevalla Sjukhus

Innehållsansvar: Karin Nyberg, (karny7),
Röntgensjuksköterska

Godkänd av: Carl Hansen, (carha61), Enhetschef

Dokument-ID: NU10095-1819752655-359

Version: 11.0

Giltig från: 2025-09-16

Giltig till: 2027-09-16