

Gäller för: Radiologisk mottagning NÄL

Innehållsansvar: Carina Granström, (cagr2), Undersköterska

Godkänd av: Ann Örtoft, (annor12), Överläkare

Giltig från: 2024-10-30

Giltig till: 2026-10-30

# Provtagningsanvisning för tularemi (harpest)

## Metodbok Ultraljud

Rutin för provtagning i samband med finnålsbiopsi med ultraljud.

## Förändringar sedan föregående version

## Utförs

NÄL

## Material

	NÄL
Provrör med gul kork	Låda 4
Skyddsförpackning	Låda 4

## Provtagning

Använd munskydd

## Vätska

- I sterilt rör.
- **OBS!** Om bara några droppar vätska: Spruta dropparna i sterilt rör och aspirera med samma kanyl minimal mängd koksalt och spruta i samma rör, till sammanlagd mängd cirka 1 ml. Ange på remissen att provet spätts ut.

## Biopsi/Vävnad

- I sterilt rör med tillsats av några droppar koksalt.

Alla prov ska skickas i skyddsförpackning.  
Provmaterialet är infektiöst.

Förslut provkärl väl, se till att inget spill finns  
på provkärls utsida och lägg det i  
skyddsförpackningen, som också försluts väl.



## Prov/remiss lämnas

- Telefonkontakt med remitterande avdelning för att få ifyllda remisser och uppmärkta provrör.
- Prover skickas med patienten till avdelningen.
- Remittenten ombesörjer att proverna skickas vidare kyllda till Umeå.

## Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Radiologisk mottagning NÄL

**Innehållsansvar:** Carina Granström, (cargr2), Undersköterska

**Godkänd av:** Ann Örtoft, (annor12), Överläkare

**Dokument-ID:** NU10095-1819752655-413

**Version:** 6.0

**Giltig från:** 2024-10-30

**Giltig till:** 2026-10-30