OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Gäller för: Radiologisk mottagning NÄL
Innehållsansvar: Carina Granström, (cargr2), Undersköterska
Godkänd av: Ann Örtoft, (annor12), Överläkare
Giltig från: 2026-10-28
Giltig till: 2027-01-31

Provtagningsanvisning för tularemi (harpest)

Metodbok Ultraljud

Rutin för provtagning i samband med finnålsbiopsi med ultraljud.

Förändringar sedan föregående version

Inga förändringar.

Utförs

NÄL

Material

	NÄL
Provrör med gul kork	Låda 4
Skyddsförpackning	Låda 4

Provtagning

Använd munskydd

Vätska

- I sterilt rör.
- **OBS!** Om bara några droppar vätska: Spruta dropparna i sterilt rör och aspirera med samma kanyl minimal mängd koksalt och spruta i samma rör, till sammanlagd mängd cirka 1 ml. Ange på remissen att provet spätts ut.

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

Biopsi/Vävnad

- I sterilt rör med tillsats av några droppar koksalt.

Alla prov ska skickas i skyddsförpackning. Provmaterialet är infektiöst.

Förslut provkärl väl, se till att inget spill finns på provkärlets utsida och lägg det i skyddsförpackningen, som också försluts väl.



Prov/remiss lämnas

- Telefonkontakt med remitterande avdelning för att få ifyllda remisser och uppmärkta provrör.
- Prover skickas med patienten till avdelningen.
- Remittenten ombesörjer att proverna skickas vidare kylda till Umeå.

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Radiologisk mottagning NÄL

Innehållsansvar: Carina Granström, (cargr2), Undersköterska

Godkänd av: Ann Örtoft, (annor12), Överläkare

Dokument-ID: NU10095-1819752655-413

Version: 7.0

Giltig från: 2026-10-28

Giltig till: 2027-01-31