

Gäller för: Radiologisk mottagning NÄL, Radiologisk mottagning Uddevalla Sjukhus

Giltig från: 2024-08-13

Innehållsansvar: Ann-Christine Frendius, (annan83), Överläkare

Giltig till: 2026-08-13

Granskad av: Maria Viksten Ericsson, (marwi1), Verksamhetschef

Godkänd av: Carl Hansen, (carha61), Enhetschef

Provtagningsrutiner för palliativa patienter

Sammanfattning/syfte

Rutinprover (PK, APTT, P-kreatinin) inför kontrastundersökningar och ultraljudsleda punktioner behöver inte tas på patienter inskrivna hos Palliativa enheten.

Förändring sedan föregående version

Inga förändringar i denna version.

Åtgärder

Palliativa enhetens läkare ansvarar för nedanstående patienter och detta anges i remissen.

Kontrastundersökningar

- Patienter inskrivna hos Palliativa enheten med upprepade stabila och normala kreatinivärden (senaste värde < 1 vecka), behöver inte ta nya prover inför radiologisk kontrastundersökning.
- Remitterande ansvarig läkare säkrar sig att patienten inte har någon akut orsak till misstänkt njurpåverkan kliniskt.

Ultraljudsledda punktioner

- Koagulationsvärden krävs inte inför buk- och pleuratappningar hos patienter i livets slutskede där tappning bedöms vara viktig i symtomlindrande syfte.
- Önskemål om tappning med tunn nål istället för tappningskateter anges i remissen.

Information om handlingen

Handlingstyp: Riktlinje

Gäller för: Radiologisk mottagning NÄL, Radiologisk mottagning Uddevalla Sjukhus

Innehållsansvar: Ann-Christine Frennius, (annan83), Överläkare

Granskad av: Maria Viksten Ericsson, (marwi1), Verksamhetschef

Godkänd av: Carl Hansen, (carha61), Enhetschef

Dokument-ID: NU10095-1819752655-414

Version: 8.0

Giltig från: 2024-08-13

Giltig till: 2026-08-13