

Gäller för: Radiologisk mottagning NÄL, Radiologisk mottagning Uddevalla Sjukhus

Giltig från: 2026-01-26

Innehållsansvar: Sverker Torgerson, (sveto1), Överläkare

Giltig till: 2028-01-26

Godkänd av: Sverker Torgerson, (sveto1), Överläkare

Rektoskopi inför undersökning av tjocktarmen

Bakgrund

Rektoskopi kan ge svar på om det finns sjukliga förändringar i ändtarmen som utgör ett hinder för undersökningen.

Undersökning av tjocktarmen utförs med hjälp av koldioxid som ges via en pip i ändtarmen. På grund av pipen kan de sista cirka 5 centimetrarna ej bedömas.

Förändringar sedan föregående version

Inga förändringar.

Åtgärder

- Rektoskopi ska vara utfört innan datortomografiundersökning av tjocktarmen utförs.
- Är koloskopi eller proktoskopi utfört är detta tillräckligt.
- Rektoskopiundersökning (alternativt koloskopi eller proktoskopi) får inte vara äldre än 6 månader.
- Specifik regim gäller vid kolondiagnostik som uppföljning efter divertikulit, se [Kolondiagnostik vid uppföljning efter divertikulit, riktlinjer i NU-sjukvården](#)

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Radiologisk mottagning NÄL, Radiologisk mottagning
Uddevalla Sjukhus

Innehållsansvar: Sverker Torgerson, (sveto1), Överläkare

Godkänd av: Sverker Torgerson, (sveto1), Överläkare

Dokument-ID: NU10095-1819752655-416

Version: 9.0

Giltig från: 2026-01-26

Giltig till: 2028-01-26