

Gäller för: Radiologisk mottagning Uddevalla Sjukhus
Innehållsansvar: Karin Nyberg, (karny7), Röntgensjuksköterska
Godkänd av: Rajka Olsson Balta, (rajba1), Teamledare

Giltig från: 2025-03-25

Giltig till: 2027-03-25

Arbetsrutin DT-lab. röntgensjuksköterskor – Uddevalla

Bakgrund

Att tydliggöra arbetsuppgifterna för röntgensjuksköterskorna på DT-lab. – Uddevalla Sjukhus.

Förändringar sedan föregående version

Reviderad, smärre textjustering.

Röntgensjuksköterskorna ansvarar för att:

- Hålla kontakt med remitterande avdelningar angående förberedelser, frågeformulär, P-kreatinin och eftervård.
- Utföra telefonbokningar och svara på övriga förfrågningar.
- Boka patienter från den dynamiska akutlistan, där prioritet är satt till ”akut” upp till ”inom 1 vecka” och patienten fortsatt är ineliggande. Vid behov kan man alltid ta hjälp av bokningsgruppen.
- Övriga undersökningar på den dynamiska akutlistan samt undersökningar där patienten gått hem (skriv en remissanteckning i RIS), om- och avbokas samt flaggas till bokningsgruppen.

Funktion 1 –

Arbetar i manöverrummet med bildtagning och ansvarar för att:

- Rätt ID är signerat i RIS.
 - Rätt patient är framtagen på modalitet.
 - Undersökningarna utförs korrekt och i enlighet med prioriteringen som är utförd av radiolog.
 - Rätt protokoll och rätt undersökningskort används.
 - Rätt kontrast och mängd ges till patienten.
- Observera:** Slangsetet byts då vi byter kontrastmedel, aldrig två olika kontrastmedel i samma slangset.

- Rekonstruktioner/reformateringar utförs korrekt enligt metodboken och skickas till PACS/Syngo.via.
- Dokumentation av undersökningsdata utförs i RIS.
- Dokumentation av kontrastmedel, mängd och administrationssätt utförs i RIS.
- Undersökningar segmenteras om så behövs.
- Röntgensjuksköterskan ska efter varje undersökning kontrollera att undersökningen är korrekt arkiverad i PACS.

Funktion 2 –

Arbetar inne på labbet och i förberedelserummet och ansvarar för att:

- Rätt kontrastmedel och Natriumklorid finns uppdraget i kontrastsprutan.
- Placera patienten korrekt på undersökningsbordet.
- Sätta PVK eller kontrollera att PVK:er som är satta på avdelningen fungerar korrekt så att injektionen inte går subkutant.
- Kunna använda Port-a-cath powerport, PICC-line korrekt vid kontrastinjektion. Se [Vårdhandboken](#)
- Kontrollera om det föreligger kontraindikationer mot:
 - Att ge kontrastmedel.
 - Att ge Buscopan vid DT-kolon.
- Rutin vid DT-kolon:
 - Applicera kolon-pipen
 - Ge Buscopan intravenöst
 - Utföra insufflationen korrekt
- Kontrollera patientens tillstånd i samband med och efter kontrastinjektion.

Kvällsunderhåll (utförs efter sista bokade patient)

- Töm kontrastsprutan och ta bort hållarna för rengöring.
- Lägg hållarna i blöt och låt ligga i cirka 10 min för att sedan lufttorka över natten.
- Byt till rena hållare.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Radiologisk mottagning Uddevalla Sjukhus

Innehållsansvar: Karin Nyberg, (karny7),
Röntgensjuksköterska

Godkänd av: Rajka Olsson Balta, (rajba1), Teamledare

Dokument-ID: NU10095-1819752655-60

Version: 12.0

Giltig från: 2025-03-25

Giltig till: 2027-03-25