

Gäller för: Operation Uddevalla sjukhus, Operation NÄL, Ortopedi

Giltig från: 2025-08-07

Innehållsansvar: Ioannis Karikis, (ioaka1), Överläkare

Giltig till: 2027-08-07

Granskad av: Sinan Abdulla, (senab1), Överläkare

Godkänd av: Hans Svensson, (hansv16), Verksamhetschef

Blodtomt fält (BTF) vid artroskopisk kirurgi och vissa ingrepp inom artroteamet

Bakgrund

Vid artroskopiska operationer används BTF för att ha optimal vy av leden man opererar. Vissa artroskopiska operationer kan emellertid utföras utan BTF. Det är de fall där man inte förväntar sig en störande intraoperativ blödning eller kortare operationstid.

Syfte

Skapa ett dokumentstöd gällande artroskopiska ingrepp med eller utan BTF.

Vilka berörs

All personal på operationsavdelningar och Ortopedkliniken i NU-sjukvården.

Ingrepp med BTF

Knäled

- artroskopiska eller öppna ligamentrekonstruktioner (främre/bakre korsband, medial [MCL]/lateral [LCL] kollateral ligament, medial patellofemoralligament [MPFL])
- patellastabiliserande ingrepp (medial plicering, lateral release, tuberositastransposition, MPFL-rekonstruktion)
- menisksuturering
- broskkirurgi
- synovektomi
- tibiaosteotomi

Fotledsartroskopi

Armbågsartroskopi

Handledarsartroskopi

Ingrepp utan BTF

Knäled

- meniskresektioner
- artroskopisk exploration
- quadriceps/patellärsena reparation/rekonstruktion (man vill inte ha muskelkontraktion på grund av BTF)
- femurosteotomi

- **Patient med kärlgraft i den aktuella extremiteten ska inte opereras i BTF!**
- **Operatören ordinerar när och hur BTF ska användas.**
- **Gällande användning av BTF hänvisar man till nedanstående PM:**
[Blodtomt fält](#)

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Operation Uddevalla sjukhus, Operation NÄL, Ortopedi

Innehållsansvar: Ioannis Karikis, (ioaka1), Överläkare

Granskad av: Sinan Abdulla, (senab1), Överläkare

Godkänd av: Hans Svensson, (hansv16), Verksamhetschef

Dokument-ID: NU10097-1520354460-100

Version: 4.0

Giltig från: 2025-08-07

Giltig till: 2027-08-07