

Gäller för: Ortopedi

Innehållsansvar: Isabell Barksten Sävland, (isaba), Överläkare

Granskad av: Sinan Abdulla, (senab1), Enhetschef

Godkänd av: Hans Svensson, (hansv16), Verksamhetschef

Giltig från: 2024-09-12

Giltig till: 2026-09-12

# Nålfasciotomi

## Revidering i denna version

Uppdatering har skett under material att använda

## Bakgrund

Patient med Dupuytren's kontraktur med palpabel sträng i handflatan och sträckdefekt MCP-leden. Operationen syftar till att få bättre sträckning i fingret/fingrarna.

## Syfte

Att skapa säkerhet och kvalitet vid nålfasciotomi.

## Vilka berörs

Vårdpersonal på Ortopedkliniken, NU-sjukvården

## Åtgärder

## Förberedelser

Informera patienten hur nålfasciotomin går till och hur det kan kännas. Patienten ska ligga bekvämt och vara avslappnad.

## Material att använda

- Hibiscrubsvamp eller Descutan
- Klorhexidinsprit
- Tvättset + sterila kompresser
- Steril operationshandduk och steril ärm, båda engångs
- Läkaren: sterila handskar, munskydd och mössa

- Läkemedel:
  - Carbocain 20 mg/ml (2 ml)
- Kanyl orange, 2-4 styck
- Kanyl rosa, 2 st - för uppdragning av bedövning
- Spruta 3 ml, 1 st
- Plåster 5 x 5 cm, 1-3 st
- Sterila kompresser

## Utförande

1. Tvätta hela handen och halva underarmen med hibiscrubsvamp (Descutan) i tre minuter. Torka av.
2. Tvätta med klorhexidinsprit 5mg/ml. Låt lufttorka.
3. Lägg sterila operationshanddukar och sätt på steril ärm. Mudden ska sluta vid handleden.
4. Sterila kompresser
5. Assistera läkaren vid bedövning och vid fasciotomin.

## Evidens/källa:

Vårdhandboken

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Ortopedi

**Innehållsansvar:** Isabell Barksten Sävland, (isaba), Överläkare

**Granskad av:** Sinan Abdulla, (senab1), Enhetschef

**Godkänd av:** Hans Svensson, (hansv16), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** NU10097-1520354460-137

**Version:** 8.0

**Giltig från:** 2024-09-12

**Giltig till:** 2026-09-12