

Gäller för: Avdelning 52-55 NÄL, Ortopedi
Innehållsansvar: Åsa Larsson, (asape14), Undersköterska
Granskad av: Eva Olsson, (evaol42), Vårdenhetschef
Godkänd av: Hans Svensson, (hansv16), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-12-03

Giltig till: 2027-12-03

Omläggning av externfixation

Revidering i denna version

Rutinen har reviderats.

Bakgrund

På operation sätts Allevyn runt stagen och de skall sitta i 3–4 dagar.

Åtgärder

Börja med att ta bort sårsekret och sårskorpor.

Tvätta inifrån och ut med klorhexidin, byt kompress flera gånger.

Sätt sedan 2–3 lager med Allevyn plattor (utan häfta) kring pinnen och fäst detta med plastclips, dessa ska inte tryckas ner mot såret.

Inga lindor eller annat behövs för att fästa Allevyn. Dessa plastclips finns att hämta på ortopedmottagningen. Allevynen byts 2 gånger i veckan.

Allevyn finns att beställa via marknadsplatsen.

Om Allevyn är slut görs omläggning med Polymem enligt nedan.

Börja med att ta bort sårsekret och sårskorpor.

Tvätta inifrån och ut med klorhexidin, byt kompress flera gånger.

Sätt Polymem kring pinnen och fäst detta med plastclips, dessa ska inte tryckas mot såret. (Dessa plastclips finns att hämta på ortopedmottagningen.)

Kan lindas med Pehafix för att skydda mot bakterier.

Omläggning görs 2 gånger i veckan.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Avdelning 52-55 NÄL, Ortopedi

Innehållsansvar: Åsa Larsson, (asape14), Undersköterska

Granskad av: Eva Olsson, (evaol42), Vårdenhetschef

Godkänd av: Hans Svensson, (hansv16), Verksamhetschef

Dokument-ID: NU10097-1520354460-138

Version: 4.0

Giltig från: 2025-12-03

Giltig till: 2027-12-03