

Gäller för: Ortopedi

Innehållsansvar: Ida Franzén, (idafr5), Överläkare

Godkänd av: Hans Svensson, (hansv16), Verksamhetschef

Giltig från: 2026-04-10

Giltig till: 2028-04-10

Ordinationsmallar Melior, Ortopedkliniken

Revidering i denna version

Ingen revidering i denna version. Giltighetstiden förlängd.

Bakgrund

Som del i klinikövergripande arbete med säker läkemedelsförskrivning ska läkare så långt möjligt använda ordinationsmallar.

Syfte

Säker läkemedelsförskrivning

Vilka berörs

Ortopedkliniken, Akutkliniken

Ordinationsmallar: Akutpatienter

Fraktur smärtlindring (äldre)

Cilaxoral Orala droppar 7,5 mg/ml (=10)

Targiniq Depotablett 5mg/2,5mg (=2)

Oxynorm Kapsel 5 mg (1 vb)

Alvedon Filmdragen tablett 500 mg (=6)

Fraktur smärtlindring (yngre)

Cilaxoral Orala droppar 7,5 mg/ml (=10)

Targiniq Depotablett 5mg/2,5mg (=4)

Oxynorm Kapsel 5 mg (1 vb)

Alvedon 500 mg (=8)

Cloxacillin - Enkel antibiotika

Cloxacillin 2g x 1 intravenöst (pm) 30-45 minuter före operationsstart

Cloxacillin - Förlängd antibiotika

Cloxacillin 2g x 3 intravenös (pm) första dos 30-45 minuter före operationsstart med andra dos 4 timmar efter första dosen. Tredje dos 12 timmar efter första dosen.

Dalacin - Enkel antibiotika

Dalacin 600mg x 1 intravenöst (pm) 30-45 minuter före operationsstart. Vid pc-allergi.

Dalacin - Förlängd antibiotika

Dalacin 600mg x 2 intravenöst (pm) första dosen 30-45 minuter före operationsstart med andra dosen 4 timmar efter första dosen. Vid pc-allergi.

Dalacin vid akut protesoperation

Dalacin 600mg x 2 intravenöst (pm) första dosen 30-45 minuter före operationsstart med andra dosen 4 timmar efter första dosen. Vid pc-allergi.

Cloxacillin vid akut protesoperation

Cloxacillin 2g x 3 intravenöst (pm) första dos 30-45 minuter före operationsstart med andra dos.

2 timmar efter första och tredje dos 6 timmar efter första.

Fragmin 4 veckor

Fragmin injektionsvätska 5000IE (=1) – 4 veckor postoperativt

Fragmin 10 dagar

Fragmin injektionsvätska 5000IE (=1) – 10 dagar postoperativt

Ordinationsmallar: Ryggkirurgi

Ryggkirurgi

Cilaxoral Orala droppar 7,5 mg/ml (=10)

Targiniq Depotablett 5mg/2,5mg (=4)

Oxynorm Kapsel 5 mg (1 vb)

Alvedon Filmdragerad tablett 500 mg (=8)

Cyklokapron injektionslösning 100mg/ml (pm) injektion cirka 10 minuter innan operationsstart, om operation överstiger 3 timmar kan dosen upprepas.

Cloxacillin 2g x 3 intravenöst (pm) första dos 30-45 minuter före operationsstart med andra dos 2 timmar efter första och tredje dos 6 timmar efter första.

Dalacin vid ryggoperation

Dalacin 600mg x 2 intravenöst (pm) första dosen 30-45 minuter före operationsstart med andra dosen 4 timmar efter första dosen. Vid pc-allergi.

Ordinationsmallar: elektiv proteskirurgi knä- och höft- protesoperation

Höftprotes elektiv

Cilaxoral Orala droppar 7,5 mg/ml (=10)

Etoricoxib tablett 60mg (=1)

Targiniq Depotablett 5mg/2,5mg (=4)

Alvedon Filmdragerad tablett 500 mg (=8)

Postafen tablett- 25mg (=2)

Eliquis Filmdragerad tablett 2,5mg (=2)

Cloxacillin 2g x 3 intravenöst (pm) första dos 30-45 minuter före operationsstart med andra dos 2 timmar efter första och tredje dos 6 timmar efter första.

Oxynorm Kapsel 5 mg (1 vb)

Knäprotes med LIA

Cilaxoral Orala droppar 7,5 mg/ml (=10)

Etoricoxib tablett 60mg (=1)

Targiniq Depotablett 5mg/2,5mg (=4)

Alvedon Filmdragerad tablett 500 mg (=8)

Postafen tablett 25mg (=2)

Eliquis Filmdragerad tablett 2,5mg (=2)

Cloxacillin 2g x 3 intravenöst (pm) första dos 30-45 minuter före operationsstart med andra dos 2 timmar efter första och tredje dos 6 timmar efter första.

Oxynorm Kapsel 5 mg (1 vb)

Knäprotes utan LIA

Cilaxoral Orala droppar 7,5 mg/ml (=10)

Targiniq Depotablett 5mg/2,5mg (=4)

Alvedon Filmdragerad tablett 500 mg (=8)

Postafen tablett 25 mg (=2)

Eliquis Filmdragerad tablett 2,5mg (=2)

Cloxacillin 2g x 3 intravenöst (pm) första dos 30-45 minuter före operationsstart med andra dos 2 timmar efter första och tredje dos 6 timmar efter första.

Oxynorm Kapsel 5 mg (1 vb)

Dalacin vid elektiv protesoperation

Dalacin 600mg x 2 intravenöst (pm) första dosen 30-45 minuter före operationsstart med andra dosen 4 timmar efter första dosen. Vid pc-allergi.

Ordinationsmallar: Axelprotes

Axelprotes elektiv

Cilaxoral Orala droppar 7,5 mg/ml (=10)

Targiniq Depotablett 5mg/2,5mg (=4)

Alvedon forte Filmdragerad tablett 1g (=4)

Cloxacillin 2g x 3 intravenöst (pm) första dos 15-45 minuter före operationsstart med andra dos 2 timmar efter första och tredje dos 6 timmar efter första.

Bensylpenicillin 3g x 3 intravenöst (pm) första dos 15-45 minuter före operationsstart med andra dos 2 timmar efter första och tredje dos 6 timmar efter första.

Oxynorm Kapsel 5 mg (1 vb)

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Ortopedi

Innehållsansvar: Ida Franzén, (idafr5), Överläkare

Godkänd av: Hans Svensson, (hansv16), Verksamhetschef

Dokument-ID: NU10097-1520354460-56

Version: 7.0

Giltig från: 2026-04-10

Giltig till: 2028-04-10