OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Gäller för: Ortopedi
Innehållsansvar: Jonas Magnusson, (jonma4), Överläkare
Granskad av: Dlshad Majeed Qadir, (dlsqa2), Enhetschef
Godkänd av: Hans Svensson, (hansv16), Verksamhetschef

Giltig från: 2026-08-18
Giltig till: 2028-08-18

Antibiotikaprofylax vid tandvårdsingrepp på patient med ledprotes

Revidering i denna version

Ingen revidering i denna version, endast förlängd giltighetstid.

Bakgrund

Protesnära infektion drabbar några procent av alla patienter med ledprotes. Vid cirka 5 % av dessa fall är bakterien som orsakar infektionen härledbar från munhålans bakterieflora. Även i de fall där ledprotesinfektionen uppstått med bakterier som återfinns i munnens normalflora, är det mer sannolikt att dessa bakterier sprids spontant än av tandvården i sig. Ingen vetenskaplig studie finns som stödjer bruket av antibiotikaprofylax vid tandvård som generell åtgärd. Våra riktlinjer följer Läkemedelsverkets rekommendationer, vilket innebär följande.

Syfte

Att beskriva de fall där profylaktisk antibiotika ska ges hos patient med ledprotes inför vissa tandvårdsingrepp.

Vilka berörs

Ortopedkliniken

Rekommendationer

Grundläggande och enskilt viktigast är att patienten har en god munhygien.
I normalfallet behöver ej antibiotikaprofylax ges vid tandvård hos patient med ledprotes.

Vid vilka tandvårdsingrepp kan det vara aktuellt med antibiotika till patient med ledprotes?

- Tandextraktion
- Tandstensskrapning
- Oral kirurgi

För vilka patientgrupper är det aktuellt med antibiotika vid ovanstående ingrepp?

- Nyopererad patient, d.v.s. patient som genomgått ledprotesoperation inom tre månader.
- Tre eller fler av nedanstående riskfaktorer:
  - övervikt, BMI >35
  - rökare
  - anemi
  - dålig munhälsa, dåligt tandstatus
  - känd immunbrist
  - ASA III eller IV
  - ålder över 80 år
  - långvariga käkingrepp

Preparat och dosering

I normalfallet till vuxen patient ges tablett Amoxicillin 2 g, en timma innan ingrepp, som engångsdos. Föreligger pc-allergi hos vuxen patient ges kapsel Klindamycin 600 mg, en timma innan ingrepp, som engångsdos.

Referens:
http://www.lakemedelsverket.se/malgrupp/Halso---sjukvard/Behandlings--rekommendationer/Behandlingsrekommendation---listan/-Antibiotikaprofylax-i-tandvarden/

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Ortopedi

Innehållsansvar: Jonas Magnusson, (jonma4), Överläkare

Granskad av: Dlshad Majeed Qadir, (dlsqa2), Enhetschef

Godkänd av: Hans Svensson, (hansv16), Verksamhetschef

Dokument-ID: NU10097-1520354460-93

Version: 7.0

Giltig från: 2026-08-18

Giltig till: 2028-08-18