

# Adrenalin – lokal injektion vid fotkirurgi

## Förändringar sedan föregående version

Ingen revidering i denna version. Giltighetstiden förlängd.

## Bakgrund och syfte

Indikation: Att minska blödning från sår vid fotkirurgiskt ingrepp.

## Utförande

### 1. Beredning: Lokal injektion vid kirurgi eller i led

Adrenalin 0,1 mg/ml 1 ml

NaCl 0,9% 19 ml

Färdig lösning innehåller: Adrenalin 5 mikrogram/ml

**Dosering:** Hos vuxna patienter 20-40 ml av färdig lösning injiceras lokalt av operatör.

### 2. Cyklokapron 100 mg/ml. 10 ml ges preoperativt.

## Kontraindikation:

Överkänslighet mot adrenalin eller mot något hjälpmedel.

## Iakta försiktighet vid:

- Hjärtarytmi
- Hypertoni
- Ischemisk hjärtsjukdom

## Stoppa injicering vid:

- Nyttillkommen arytm eller extraslag

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

- >30% ökning i HF eller systoliskt BT jämfört med preoperativt värde.

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Ortopedi

**Innehållsansvar:** Sinan Abdulla, (senab1), Överläkare

**Godkänd av:** Hans Svensson, (hansv16), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** NU10097-1869289359-267

**Version:** 1.0

**Giltig från:** 2025-12-03

**Giltig till:** 2027-12-03