

Gäller för: Ögonsjukvård  
Innehållsansvar: Saif Abdulrahman, (saiab1), Överläkare  
Granskad av: Flera granskare finns - se eftersättsblad  
Godkänd av: Martin Thiel, (marth43), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-10-23

Giltig till: 2027-10-23

## **EDTA-spolning (CGE99)**

---

### **Åtgärder**

Notera i kallelse att patient skall ta 1gr Alvedon hemma.

Förberedelse preoperativt:

Standarddroppar inför operation, Oftaquix x 3.

Ge 1 gr Alvedon (kombinerad med T.Oxynorm 5 mg vid behov och om patienten tål det)  
T.Oxynorm kan hämtas från sällan läkemedelsförråd.

Droppta Tetracain strax innan patient undersökes av läkaren. Läkaren undersöker patient i mikroskop.

Tetracain droppar innan skrapning av kornea.

Ta fram främmandekroppss instrument, crescent kniv och blefarostat.

Om det inte går att hålla isär ögonlocken kan blefarostat användas.

Ssk assisterar vid skrapning av kornea.

Kornea skrapas av läkaren.

Patient får därefter EDTA-spolning av ca 200 ml i 15 min.

Läkaren kontrollerar därefter i mikroskop, ssk är med och assisterar.

Vid behov abraderas mer över kornea.

Vid behov ytterligare spolning och skrapning upprepas.

Till sist spola rent med koksalt och sätt i bandagelins.

Recept på antibiotika, droppar eller salva i 10 dagar.

Information till patient: Om värk ta Alvedon 1gr x 4 per dag.

Återbesök om 3 veckor för kontroll och bandagelins byte.

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Ögonsjukvård

**Innehållsansvar:** Saif Abdulrahman, (saiab1), Överläkare

**Granskad av:** Saif Abdulrahman, (saiab1), Överläkare, Annika Skarstedt, (annsk26), Teamledare

**Godkänd av:** Martin Thiel, (marth43), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** NU10102-675416934-100

**Version:** 14.0

**Giltig från:** 2025-10-23

**Giltig till:** 2027-10-23