

Gäller för: Ögonsjukvård

Innehållsansvar: Hayder Yakob, (hayya1), Överläkare

Godkänd av: Martin Thiel, (marth43), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-02-04

Giltig till: 2027-02-04

## **Fluoresceinangiografi i samband med njurinsufficiens**

---

### **Syfte**

Avsett för diagnostiskt bruk för fluoresceinangiografi av ögonbotten och för patienter med njurinsufficiens (glomerulusfiltrationshastighet under 20 ml/min).

### **Åtgärder**

**Fluorescite injektionsvätska ges snabbt i venen i armvecket, efter åtgärder för att motverka extravasering har vidtagits.**

### **Indikation**

Läkemedlet Fluorescite (Fluoresceinnatrium, injektionsvätska lösning 100 mg/ml. Endast avsett för diagnostiskt bruk för fluoresceinangiografi av ögonbotten och för patienter med njurinsufficiens (glomerulusfiltrationshastighet under 20 ml/min).

### **Njurinsufficiens**

Ingen dosjustering krävs i allmänhet av detta läkemedel vid fluoresceinangiografiundersökning, även om en lägre utsöndringshastighet är möjligt hos patienter med njurinsufficiens.

### **Dialyspatienter**

Minska dosen till 2,5 ml för dessa patienter vid fluoresceinangiografi.

Vid svårt sjuka patienter med njursjukdom skall beställande läkare till angiografi ta kontakt med patientens behandlande njurläkare och samråda med denna inför angiografi och ICG.

Detta PM är baserat på uppgifter hämtade från Läkemedelsinformation i FASS (www.fass.se).

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Ögonsjukvård

**Innehållsansvar:** Hayder Yakob, (hayya1), Överläkare

**Godkänd av:** Martin Thiel, (marth43), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** NU10102-675416934-113

**Version:** 17.0

**Giltig från:** 2025-02-04

**Giltig till:** 2027-02-04