

Gäller för: Ögonsjukvård

Innehållsansvar: Bassel Qaddoura, (basqa1), Överläkare

Granskad av: Bassel Qaddoura, (basqa1), Överläkare

Godkänd av: Martin Thiel, (marth43), Verksamhetschef

Giltig från: 2026-01-09

Giltig till: 2028-01-09

Förberedelser inför cyklodiodlaser/ näthinnecryo/ cyklocryo

Patienter behöver antingen en **subtenonal** (görs på salen) eller en **retrobulbär** (kan göras redan på torget) **bedövning**:

- Om en **subtenonal** bedövning ska göras görs alla förberedelser av personalen på salen.
- Patienten hämtas från väntrummet till torget där man kontrollerar identiteten.
- Patienten tar på patientskjorta, skoskydd och operationsmössa.
- Ta ur hörapparat, om sådan finns på den aktuella sidan
- Om en retrobulbär bedövning ska göras på torget inväntas läkare som lägger bedövningen.

Ögat droppas med 1 x Tetracain 1-2 minuter innan bedövningen, [se PM om retrobulbär injektion.](#)

- Patienten ska desinfektera sina händer med handsprit.
- Läkaren tar med patienten in på operation.
- Tar emot patienten efter operation, därefter går patienten hem.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Ögonsjukvård

Innehållsansvar: Bassel Qaddoura, (basqa1), Överläkare

Granskad av: Bassel Qaddoura, (basqa1), Överläkare

Godkänd av: Martin Thiel, (marth43), Verksamhetschef

Dokument-ID: NU10102-675416934-117

Version: 16.0

Giltig från: 2026-01-09

Giltig till: 2028-01-09