

Gäller för: Ögonsjukvård

Innehållsansvar: Bassel Qaddoura, (basqa1), Överläkare

Godkänd av: Martin Thiel, (marth43), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-01-17

Giltig till: 2027-01-16

## Förberedelser inför nålrevision

---

### Reviderat i denna version

Uppdaterat med läkemedlen Voltaren Ophtha och Iopidine under Åtgärder.

### Åtgärder

Patienten hämtas från väntrum till torget, där man kontrollerar identiteten.

Patienten tar på patientskjorta, skoskydd och operationsmössa.

Vilket öga ska opereras?

Infektionstecken? Feber, förkylningssymptom?

Annan infektion, antibiotika? Öppna sår, herpes?

Infektionstecken i ögat? Inspektera sekret, pus, vagel, blefarit?

1 x Tetracain i operationsögat

1 x Voltaren Ophtha

1 x Iopidine

Patienten ska desinfektera sina händer med handsprit.

Läkaren tar med patienten in på operation.

Tar emot patienten efter operation.

Patienten får med en ny tid dagen efter för 5-FU injektion.

Efter ingrepp ges eventuella postoperativa droppar därefter hemgång.

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Ögonsjukvård

**Innehållsansvar:** Bassel Qaddoura, (basqa1), Överläkare

**Godkänd av:** Martin Thiel, (marth43), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** NU10102-675416934-119

**Version:** 13.0

**Giltig från:** 2025-01-17

**Giltig till:** 2027-01-16