

Gäller för: Ögonsjukvård

Innehållsansvar: Hayder Yakob, (hayya1), Överläkare

Godkänd av: Martin Thiel, (marth43), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-06-18

Giltig till: 2027-06-18

## Förberedelser inför retinalaserbehandling

### Sammanfattning/syfte

Skapa en standard och förenkla förberedelserna med ögondroppar inför laserbehandling.

### Förberedelse inför näthinnelaser, scatter, fokal, grid, mikropuls laser (diabetes, centralvenstrombos m m):

#### Vid förstabetesök/remiss:

\***Visus** enligt Snellen ska tas på alla patienter (båda ögonen) inför laseroperationer. Vid glaukom mät ögontryck med luftpuff/applanation innan dilatation.

\***Max dilatation** med 1 droppe Tropicamid 0,5 % (5 mg/ml) och 1 droppe Phenylephrine Hydrochloride 10,0% (100 mg/ml) i det aktuella ögat 30 minuter före behandling.

#### Vid återbesök:

\***Visus:** Ta endast visus vid synförändring.

\***Max dilatation** med 1 droppe Tropicamid 0,5 % (5 mg/ml) och 1 droppe Phenylephrine Hydrochloride 10,0% (100 mg/ml) i det aktuella ögat 30 minuter före behandling.

\*Vid ny behandlingsomgång – förbereds som vid första besök.

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Ögonsjukvård

**Innehållsansvar:** Hayder Yakob, (hayya1), Överläkare

**Godkänd av:** Martin Thiel, (marth43), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** NU10102-675416934-121

**Version:** 19.0

**Giltig från:** 2025-06-18

**Giltig till:** 2027-06-18