

Gäller för: Ögonsjukvård

Giltig från: 2026-02-10

Innehållsansvar: Madelen Bratvoldsen, (madek1), Sektionsledare

Giltig till: 2028-02-09

Godkänd av: Martin Thiel, (marth43), Verksamhetschef

Herpesinfektion hos personal

Enligt vårdhygien och vårdhandboken gäller följande vid Herpesinfektion (munsår):

- Vid misstanke om infektion – ta alltid kontakt med närmaste chef, som gör en individuell bedömning av vilka arbetsuppgifter som kan utföras.
- Personal som har blåsor som vätskar sig ska inte arbeta på operation/injektionssal. Munsårplåster räcker inte.
- Arbete på operation/injektionssal kan återupptas när blåsorna har torkat och det bildats en skorpa.
- Personal som har allmänsymtom i form av feber, sjukdomskänsla och utbredda blåsbildningar bör sjukskrivas.
- Personal med färska herpesblåsor på händer, armar eller i ansiktet ska inte delta i vård av nyfödda eller av barn med ökad infektionskänslighet. De ska heller inte utsätta vuxna med utbredda hudskador, till exempel brännskador, eksem och/eller ökad infektionskänslighet. I dessa situationer bör personal inte utföra arbetsuppgifter som innebär direkt patientkontakt.
- Vid täta återkommande infektionsepisoder kan antiviral behandling, som påbörjas vid första symtom, förkorta och lindra sjukdomsförloppet.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Ögonsjukvård

Innehållsansvar: Madelen Bratvoldsengen, (madek1),
Sektionsledare

Godkänd av: Martin Thiel, (marth43), Verksamhetschef

Dokument-ID: NU10102-675416934-136

Version: 7.0

Giltig från: 2026-02-10

Giltig till: 2028-02-09