

Gäller för: Ögonsjukvård
Innehållsansvar: Hayder Yakob, (hayya1), Överläkare
Godkänd av: Martin Thiel, (marth43), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-07-23

Giltig till: 2027-07-23

Indocyaningrön angiografi

Bakgrund

Indocyaningrön, styrka 25 mg, pulver till injektionsvätska lösning och avsedd för undersökning av blodflödet genom delar av ögat i chorioidea. Injiceras intravenöst och endast vatten till injektionsvätskor skall användas för att lösa indocyaningrön.

Sammanfattning/syfte

Undersökning är endast avsedd för diagnostiskt bruk av ögonbotten.

Kontraindikationer

Kontraindikation av indocyaningrön, för patienter med överkänslighet mot Indocyaningrön eller Natriumjodid såvida inte särskilda försiktighetsåtgärder vidtas. Också patienter överkänsliga mot jod och patienter med hyperthyroidism och autonoma sköldkörteladenom.

Om en injektion av indocyaningrön vid tidigare tillfälle inte tolererats väl får det inte användas igen eftersom detta kan ge allvarliga anafylaktiska reaktioner.

Vad gäller patienter med svår njurinsufficiens får indocyaningrön bara ges efter noggrann nytta/riskbedömning (d v s att det inte finns någon kontraindikation för användning av indocyaningrön hos dessa patienter).

På grund av ökad frekvens av biverkningar hos dessa patienter får man bedöma nytta eller risk med denna undersökning.

Åtgärder

- 1) Man tar alltid bilder på båda ögonen.
- 2) Alltid bilder 1 min, 2 min, 4 min, 8 min, 16 min och 25 min. Om inte läkaren ordinerar annat tidsintervall för fotografering.

Denna rutin är baserad på uppgifter hämtat från bipacksedel till produkten Indocyaningrön Pulsion.

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Ögonsjukvård

Innehållsansvar: Hayder Yakob, (hayya1), Överläkare

Godkänd av: Martin Thiel, (marth43), Verksamhetschef

Dokument-ID: NU10102-675416934-146

Version: 17.0

Giltig från: 2025-07-23

Giltig till: 2027-07-23