

Gäller för: Ögonsjukvård

Innehållsansvar: Hayder Yakob, (hayya1), Överläkare

Godkänd av: Martin Thiel, (marth43), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-01-03

Giltig till: 2026-12-19

Katarakt - uppföljning för retinapatienter

Reviderat i denna version

Reviderat under rubrik våt AMD och Trombos.

Våt AMD

För patienter med våt AMD ska återbesök stå kvar enligt läkarplanering i journalen. Om inte klart så rekommenderas då kontroll på REM-mottagning 4-6 veckor efter kataraktoperation.

Patient med makula pucker och tecken på traktion som behöver kontroll hos oss, ska komma 4-6 veckor efter kataraktoperation (ev remiss till Mölndal om det behövs) till läkarkontroll på retina process, REAM-mottagning. Obs! Patient med stabil makula pucker ska avslutas, annars remiss till Mölndal för åtgärd.

Trombos

Trombospatienter som får eller fått anti-VEGF/Ozurdex-behandling, ska planering kvarstå eller läkarplanering i journalen.

Diabetes

Patienter med diabetes ska fortsätta i de av ögonkliniken angivna screeningprogrammet för diabetesretinopathi.

Se även regional rutin: [Kataraktoperation med samtidig förekomst av diabetes mellitus](#)

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Ögonsjukvård

Innehållsansvar: Hayder Yakob, (hayya1), Överläkare

Godkänd av: Martin Thiel, (marth43), Verksamhetschef

Dokument-ID: NU10102-675416934-176

Version: 12.0

Giltig från: 2025-01-03

Giltig till: 2026-12-19