

Gäller för: Ögonsjukvård
Innehållsansvar: Hayder Yakob, (hayya1), Överläkare
Godkänd av: Martin Thiel, (marth43), Verksamhetschef

Giltig från: 2026-01-26

Giltig till: 2028-01-19

Allergiprofylax inför fluoresceinangiografi (FAI) / Indocyaningrön angiografi (ICG)

Reviderat i denna version

Ändring av Aeries till Desloratadin under Åtgärder.

Bakgrund

Fluorescein/indocyaningrön kan framkalla allergiska reaktioner

Sammanfattning/syfte

Patienter med allergi eller astma kräver extra uppmärksamhet, speciellt vid hjärtkärlsjukdomar.

Åtgärder

OBS! Måste ordineras av läkare, i tveksamma fall kontakta anestesiläkare.
Allergiprofylax är ej aktuell vid allergi mot födoämnen (t ex jordgubbar eller skaldjur).

Före undersökningen;

- 1) Först tablett Desloratadin, 5 mg, munlöslig, 2 st.
- 2) Därefter tablett Betapred 0,5 mg per os 10 stycken.

Både Desloratadin och Betapred tabletter tas minst 20 minuter innan fluoresceinangiografi.

Ovanstående behandling ska övervägas efter samråd med läkare till personer som;

- 1) Reagerat tidigare på fluoresceinangiografi/indocyaningrön, då de löper mycket stor risk för ny reaktion och man skall även fundera på om fluoresceinangiografi verkligen behöver göras.
- 2) Det finns anamnes på urticaria (nässelutslag) p g a läkemedel eller allmänt.
- 3) Anamnes på astmatisk reaktion för läkemedel.

ACE-hämmare och behandling med betablockerare skall alltid noteras i journalen.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Ögonsjukvård

Innehållsansvar: Hayder Yakob, (hayya1), Överläkare

Godkänd av: Martin Thiel, (marth43), Verksamhetschef

Dokument-ID: NU10102-675416934-18

Version: 19.0

Giltig från: 2026-01-26

Giltig till: 2028-01-19