

Gäller för: Ögonsjukvård

Giltig från: 2026-06-10

Innehållsansvar: Bella Johansson Iranipour, (belir), Överläkare

Giltig till: 2028-06-10

Godkänd av: Martin Thiel, (marth43), Verksamhetschef

# Läkemedel som får ges utan särskild läkarordination (generella direktiv)

## Reviderat i denna version

Följande läkemedel har lagts till i tabellen: Ringer-Acetat  
Infusionsvätska 1000 ml.

## Syfte

Enhetliga och säkra rutiner för dosering av läkemedel ögonoperation

## Åtgärder

**Dessa direktiv gäller för patienterna på ovan definierad enhet (HSLF-FS 2017:37).**

**Innan ett läkemedel med stöd av ett generellt direktiv om läkemedelsbehandling iordningsställs och administreras eller överlämnas till en patient ska en sjuksköterska.**

**Göra en bedömning av patientens behov av läkemedlet, och**

**Kontrollera läkemedlets indikation och kontraindikationer.**

**Bedömningen enligt punkt 1 ska dokumenteras i patientjournalen.**

| Indikation                    | Läkemedel   | Dosering  | Antal tillfällen utan läkarkontakt | Kontraindikationer/ Anmärkning |
|-------------------------------|---|---|------------------------------------|--------------------------------|
| Bedövning före operation      | Ögondroppar<br>Tetrakain 1% eller<br>oxibuprokain 4 mg/ml | 1-3ggr preop innan<br>hudtvätt                  | 3 ggr                              |                                |
| Pupillvidgning före operation | Ögondroppar<br>Cyclopentolat 1%                           | 1-3 ggr   | 3 ggr                              |                                |
| Pupillvidgning före operation | Ögondroppar<br>Phenylefrin 10%                            | 1-3 ggr   | 3 ggr                              |                                |
| Smärta                        | Tablett<br>Alvedon/Pamol 500mg                            | 500-1000 mg<br>paracetamol 3 gånger<br>dagligen | 3 ggr                              | Vuxna<br>Maxdos 3000mg/dygn    |

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

|                                   |  |                |             |                  |
|-----------------------------------|--|----------------|-------------|------------------|
|                                   | Tablett<br>Ibumetin 400 mg               | 200-400 mg     | 1 vid behov |                  |
| Sedering före operation           | Mixtur<br>Midazolam 1 mg/ml              | 2-5 ml         | 1 gång      | 10-15 min innan. |
| Bibehålla kärlaccess preoperativt | Ringer-Acetat<br>Infusionsvätska 1000 ml | 20 droppar/min | 1 gång      |                  |

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Ögonsjukvård

**Innehållsansvar:** Bella Johansson Iranipour, (belir), Överläkare

**Godkänd av:** Martin Thiel, (marth43), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** NU10102-675416934-194

**Version:** 18.0

**Giltig från:** 2026-06-10

**Giltig till:** 2028-06-10