OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Gäller för: Ögonsjukvård
Innehållsansvar: Bella Johansson Iranipour, (belir), Överläkare
Godkänd av: Martin Thiel, (marth43), Verksamhetschef
Giltig från: 2026-08-31
Giltig till: 2028-08-31

Operation - Vancomycin beredning intrakameralt katarakt

Syfte

Enhetliga och säkra rutiner för beredning och dosering av läkemedel.

Vilka berörs

Sjuksköterskor och läkare inom ögonkliniken.

Åtgärder

Används om av någon anledning Cefuroxim inte kan användas vid kataraktoperation.

1 st ampull Vancomycin 500 mg

1 st 50 ml glasflaska NaCl

1 st 10 ml NaCl

Etiketter: Vancomycin 50 mg/ml och Vancomycin 10 mg/ml

Beredning av stamlösning, 50 mg/ml:

Drag upp 10 ml NaCl i en 10 ml spruta och blanda med Vancomycin torr substans. Använd spike.

Märk denna lösning med etikett Vancomycin 50 mg/ml

Beredning av injektionslösning, 10 mg/ml:

Dra upp 18 ml NaCl ur 50 ml glasflaska och kassera (= 32 ml NaCl kvar)

Drag upp 8 ml ur stamlösningen (=400 mg) och spruta ned i glasflaskan innehållande 32 ml NaCl. Totalvolymen blir då 40 ml med styrkan 10 mg/ml.

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

Använd ej Spike då lösningen dras ur flaskan med steril kanyl på operationssal.

Märk denna förpackning med etikett: Vancomycin 10 mg/ml

Vid operation:

Vancomycin 0.1 ml (= 1 mg) ges intrakameralt med en 1 ml spruta.

(=1 mg av injektionslösning Vancomycin10 mg/ml)

Lösningen skall blandas i direkt anslutning till användandet.

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Ögonsjukvård

Innehållsansvar: Bella Johansson Iranipour, (belir), Överläkare

Godkänd av: Martin Thiel, (marth43), Verksamhetschef

Dokument-ID: NU10102-675416934-295

Version: 17.0

Giltig från: 2026-08-31

Giltig till: 2028-08-31