

Gäller för: Ögonsjukvård

Innehållsansvar: Bella Johansson Iranipour, (belir), Överläkare

Godkänd av: Martin Thiel, (marth43), Verksamhetschef

Giltig från: 2024-09-11

Giltig till: 2026-09-11

# Operation - Vancomycin beredning intrakameralt katarakt

## Syfte

Enhetliga och säkra rutiner för beredning och dosering av läkemedel.

## Vilka berörs

Sjuksköterskor och läkare inom ögonkliniken.

## Åtgärder

**Används om av någon anledning Cefuroxim inte kan användas vid kataraktoperation.**

1 st ampull Vancomycin 500 mg

1 st 50 ml glasflaska NaCl

1 st 10 ml NaCl

Etiketter: Vancomycin 50 mg/ml och Vancomycin 10 mg/ml

Beredning av stamlösning, 50 mg/ml:

Drag upp 10 ml NaCl i en 10 ml spruta och blanda med Vancomycin torr substans. Använd spike.

Märk denna lösning med etikett Vancomycin 50 mg/ml

Beredning av injektionslösning, 10 mg/ml:

Dra upp 18 ml NaCl ur 50 ml glasflaska och kassera (= 32 ml NaCl kvar)

Drag upp 8 ml ur stamlösningen (=400 mg) och spruta ned i glasflaskan innehållande 32 ml NaCl. Totalvolymen blir då 40 ml med styrkan 10 mg/ml.

Använd ej Spike då lösningen dras ur flaskan med steril kanyl på operationssal.

Märk denna förpackning med etikett: Vancomycin 10 mg/ml

Vid operation:

Vancomycin 0.1 ml (= 1 mg) ges intrakameralt med en 1 ml spruta.

(=1 mg av injektionslösning Vancomycin10 mg/ml)

Lösningen skall blandas i direkt anslutning till användandet.

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Ögonsjukvård

**Innehållsansvar:** Bella Johansson Iranipour, (belir), Överläkare

**Godkänd av:** Martin Thiel, (marth43), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** NU10102-675416934-295

**Version:** 16.0

**Giltig från:** 2024-09-11

**Giltig till:** 2026-09-11