

Gäller för: Ögonsjukvård
Innehållsansvar: Hayder Yakob, (hayya1), Överläkare
Godkänd av: Martin Thiel, (marth43), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-01-03

Giltig till: 2026-12-19

Diabetesscreening hos gravida diabetiker

Reviderat i denna version

Extra under Tillägg: Efter förlossning återgår patienter till vanlig diabetesscreening med vanligt kontrollintervall hos Digifundus.

OBS! Risk för försämring ökar under graviditeten.

Graviditetsdiabetes

Ingen risk för diabetesretinopati.

Ingen screening.

Ingen diabetesretinopati

De flesta progredierar inte.

Screening i första och tredje trimestern.

Lindrig icke-proliferativ diabetesretinopati

De flesta progredierar inte.

Screening i första och tredje trimestern.

Måttlig icke-proliferativ diabetesretinopati

Progression i upp till 50%. Efter förlossningen regredierar många.

Screening varje trimester.

Svår icke-proliferativ diabetesretinopati

Progression i upp till 50%. Efter förlossningen regredierar några.

Screening varje månad.

Proliferativ diabetesretinopati

Har tendens att försämras snabbt.

Screening varje månad.

- Behöver panretinal scatterlaserbehandling.
- Diabetiska makulaödem förbättras ofta spontant efter förlossningen och skall i första hand följas upp.

Tillägg:

Gravida som har fått missfall återgår till vanlig diabetesscreening med vanlig kontrollintervall.

Efter förlossning återgår patienter till vanlig diabetesscreening med vanligt kontrollintervall hos Digifundus.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Ögonsjukvård

Innehållsansvar: Hayder Yakob, (hayya1), Överläkare

Godkänd av: Martin Thiel, (marth43), Verksamhetschef

Dokument-ID: NU10102-675416934-89

Version: 14.0

Giltig från: 2025-01-03

Giltig till: 2026-12-19