

Gäller för: Ögonsjukvård  
Innehållsansvar: Annika Skarstedt, (annsk26), Teamledare  
Godkänd av: Martin Thiel, (marth43), Verksamhetschef

Giltig från: 2024-10-22  
Giltig till: 2026-10-22

## Operation – Etanolblockad retrobulbärt

99,5 % Etanol (30 ml) ampull

Nacl (5 ml) ampull

5 ml spruta 2 st uppdragningskanyler

1 st grå spets

3,5 ml 99,5 % Etanol blandas med 1,5 ml Nacl i en 5 ml spruta = 70 %  
Etanolblandning

Retrobulbärbedövning Marcain 5 mg/ml 2,5 ml blandas med Lidokain  
10 mg/ml 2,5 ml blandas i 5 ml spruta till retrobulbärbedövning. Grå spets.  
1 st 5 ml spruta 2 st uppdragningskanyler

Retrobulbärbedövningen ges, grå kanyl sitter kvar under ögat på patienten  
och sprutan med 70 % Etanol sätts i och 2 ml ges av Etanolblandningen.

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Ögonsjukvård

**Innehållsansvar:** Annika Skarstedt, (annsk26), Teamledare

**Godkänd av:** Martin Thiel, (marth43), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** NU10102-716428724-330

**Version:** 5.0

**Giltig från:** 2024-10-22

**Giltig till:** 2026-10-22