OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Gäller för: Ögonsjukvård
Innehållsansvar: Annika Skarstedt, (annsk26), Teamledare
Godkänd av: Martin Thiel, (marth43), Verksamhetschef
Giltig från: 2026-08-20
Giltig till: 2028-08-20

Operation – Etanolblockad retrobulbärt

99,5 % Etanol (30 ml) ampull

Nacl (5 ml) ampull

5 ml spruta 2 st uppdragningskanyler

1 st grå spets

3,5 ml 99,5 % Etanol blandas med 1,5 ml Nacl i en 5 ml spruta = 70 % Etanolblandning

Retrobulbärbedövning Marcain 5 mg/ml 2,5 ml blandas med Lidokain 10 mg/ml 2,5 ml blandas i 5 ml spruta till retrobulbärbedövning. Grå spets.
1 st 5 ml spruta 2 st uppdragningskanyler

Retrobulbärbedövningen ges, grå kanyl sitter kvar under ögat på patienten och sprutan med 70 % Etanol sätts i och 2 ml ges av Etanolblandningen.

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Ögonsjukvård

Innehållsansvar: Annika Skarstedt, (annsk26), Teamledare

Godkänd av: Martin Thiel, (marth43), Verksamhetschef

Dokument-ID: NU10102-716428724-330

Version: 6.0

Giltig från: 2026-08-20

Giltig till: 2028-08-20