

Gäller för: Ögonsjukvård

Innehållsansvar: Annika Skarstedt, (annsk26), Teamledare

Godkänd av: Martin Thiel, (marth43), Verksamhetschef

Giltig från: 2026-06-02

Giltig till: 2028-06-01

Intravitreal injektion – Handhavande på ögonoperation

Revidering i denna version

Hela rutinen är reviderad.

Syfte

Teamgemensam rutin för patienter som kommer för intravitreal injektioner och tas om hand på **ögonoperation**.

Arbetsbeskrivning/Åtgärder

Pre- postenhet

- Hämtar in patienten
- Kontrollerar ID
- Frågar om ev infektioner i kroppen, ex UVI, sår etc. Tar patienten antibiotika? Herpes, munsår? Feber, förkylningssymptom?
- Pågående infektion i något av ögonen? Rött, kladdigt, varigt? Inspektera med ficklampa. Dra ner nedre ögonlock. Observera om det finns ökad rodnad, sekret, pus eller tecken till vagel.
- Allergier, överkänsligheter?
- Ta bort eventuellt smink med Blephaclean
- Patienten ska ta på sig en engångsrock över sina egna kläder. Även skoskydd och op.mössa (även vid egen huvudbonad)
- Lås in ev värdesaker i skåp och fäst nyckel på patientens rock
- Ge patienten handsprit strax innan hen ska in på salen. Om patienten har gå-hjälpmiddel ska handtagen spritas

Operationssal

- Kontrollerar ID
- Bekräfta vilket/vilka öga/ögon som ska behandlas och märk sida för ingrepp

Ingrepp

Handhavande av läkemedel i höggradigt ren spruta

- Munskydd och sterila handskar tas på av steril personal
- Öppna ”Ögon op.set injektion”.

Osteril personal

- Häller Klorhexidinsprit 5 mg/ml på tvättork i påse
- Öppna och överlämna bedövningsdroppe till steril personal
- Osteril personal sköljer aktuellt öga med Klorhexidinlösning 0,5 mg/ml enligt rutin, om bilateralt ingrepp kan båda ögon sköljas samtidigt

Steril personal

- Tvättar runt aktuellt öga med Klorhexidinsprit 5 mg/ml enligt rutin.
- Droppar bedövningsdroppar på ögat.
- Osteril personal klipper upp påsen med förfyllt läkemedel utmed två sidor och överlämnar sprutan till injektör/steril personal.
- Steril personal tar tag i sprutan och vrider av plomben.
- Osteril personal tar kanyl och lämnar till injektör.
- **Nu är steril personal/injektör höggradigt ren.**
- Injektör inspekterar att det ej finns bubblor i sprutan och att den är fylld hela vägen upp. Den skall innehålla 0,06 ml. Fyll kanylen. Nu skall den innehålla 0,05 ml. Alternativt 0,07 ml för Eylea 8 mg.
- Om inte dessa kriterier uppfylls skall sprutan kasseras och man får börja om.
- Med hjälp av bomullspinne sätts Precivia på plats.
- Läkemedel administreras.
- Smörjande droppar ges.

Handhavande av läkemedel i steril spruta

- Munskydd och sterila handskar tas på av steril personal.
- Öppna ”Ögon op.set injektion”.

Osteril personal

- Osteril personal sköljer aktuellt öga med Klorhexidinlösning 0,5 mg/ml enligt rutin, om bilateralt ingrepp kan båda ögon sköljas samtidigt.

- Häller Klorhexidinsprit 5 mg/ml på tvättork i påse.
- Öppna och överlämna bedövningsdroppe till steril personal.
- Öppna och överlämna läkemedlet i steril spruta och steril kanyl till injektör.

Steril personal

- Iordningställer läkemedlet
- Inspekterar att det ej finns bubblor i sprutan och att den är fylld hela vägen upp. Fyll kanylen. Den grå kolvens kant ska vara vid svart markering på sprutan. Nu skall den innehålla 0,05 ml.
- Tvättar runt aktuellt öga med Klorhexidinsprit 5 mg/ml enligt rutin.
- Droppar bedövningsdroppe på ögat.
- Med hjälp av bomullspinne sätter man Precivia på ögat.
- Läkemedel administreras.
- Smörjande droppar ges.

Efter injektionen

Injektören behöver inte undersöka patienten före eller efter ingreppet, men däremot bör man vara uppmärksam på kontraindikationer för ingreppet och framför allt tecken till infektion.

Injektören skriver på Följesedel vilket öga, vilket läkemedel samt planering.

Injektören behöver inte diktera ingreppet, däremot skriver sekreterare in ingreppet i Melior enligt IV-OP mall.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Ögonsjukvård

Innehållsansvar: Annika Skarstedt, (annsk26), Teamledare

Godkänd av: Martin Thiel, (marth43), Verksamhetschef

Dokument-ID: NU10102-716428724-336

Version: 5.0

Giltig från: 2026-06-02

Giltig till: 2028-06-01