OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Gäller för: Ögonsjukvård
Innehållsansvar: Bella Johansson Iranipour, (belir), Överläkare
Godkänd av: Martin Thiel, (marth43), Verksamhetschef
Giltig från: 2026-09-22
Giltig till: 2028-09-22

Adrenalin – tillsats i BSS (Balanced Salt Solution)

Förändringar sedan föregående version

Ny rutin

Syfte

Enhetliga och säkra rutiner för beredning och dosering av läkemedel.

Vilka berörs

Sjuksköterskor och läkare inom ögonkliniken.

Åtgärder

1 st ampull Adrenalin inj 1 mg/ml.
1 st BSS 500 ml

Beredning av BSS-lösning för kataraktoperation

Dra upp 0,3 ml Adrenalin inj 1 mg/ml och injicera i 500 ml BSS-lösning.

Märk med etikett datum, tid, tillsatt läkemedel och signatur.

Förvaring

Bör användas snarast efter tillsats. Förmiddagens behov blandas på morgonen och förvaras på operationssalen under duk.

Eftermiddagens behov blandas vid lunchtid och förvaras på operationssalen under duk.

Undvik att exponera lösningen för ljus.

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Ögonsjukvård

Innehållsansvar: Bella Johansson Iranipour, (belir), Överläkare

Godkänd av: Martin Thiel, (marth43), Verksamhetschef

Dokument-ID: NU10102-716428724-365

Version: 3.0

Giltig från: 2026-09-22

Giltig till: 2028-09-22