

Allergibehandling vid fluoresceinangiografi/indocyaningrön angiografi (ICG)

Förändringar sedan föregående version

Ändring till Desloratadin istället för Aerius under Åtgärder.

Sammanfattning

Patienten har allergi eller astma som kräver extra uppmärksamhet, speciellt vid hjärtkärlsjukdomar.

Bakgrund och syfte

Fluorescein/indocyaningrön kan framkalla allergiska reaktioner.

Åtgärder

OBS! Måste ordineras av läkare, i tveksamma fall kontakta jourhavande anestesiläkare.

Lindrig reaktion som klåda, flush, urticaria, klåda i munnen, läppsvullnad, svullnadskänsla i mun/svalg, ögonsymptom, illamående, buksmärta, kräkningar och diarré.

Vid ovan symptom under angiografiundersökning ska läkare ordinera antihistamintablett Desloratadin 5 mg, munlöslig 2 stycken.

Om patienten har astma ordinera tablett Betapred 0,5 mg per os 10 stycken.

Vid misstanke om anafylaxi bör adrenalin ges så fort som möjligt. Ges tidigt och intramuskulärt i låret.

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Vid anafylaximisstankar, v g se rutin Anafylaxibehandling vuxna inom akutsjukvården, se länk: [Anafylaxibehandling vuxna inom akutsjukvården](#)

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Ögonsjukvård

Innehållsansvar: Hayder Yakob, (hayya1), Överläkare

Godkänd av: Martin Thiel, (marth43), Verksamhetschef

Dokument-ID: NU10102-716428724-393

Version: 3.0

Giltig från: 2026-06-03

Giltig till: 2028-06-03