

Gäller för: Öron- näs- hals- käkkirurgi

Innehållsansvar: Åsa Lenberg, (asale), Överläkare

Granskad av: Åsa Lenberg, (asale), Överläkare


Godkänd av: Christin Apelman Lacandler, (chrap1), Enhetschef

Giltig från: 2025-11-18

Giltig till: 2027-11-18

Intratympanal gentamicin-behandling vid Ménières sjukdom - Uppdukning

Utrustning



1. **2 st 2ml sprutor** (en för tapin-kräm och en för betapred)
2. **1 tub Tapin-kräm** 25 mg/g + 25 mg/g
3. **1 vit öronsug** (för att applicera bedövningssalvan)
4. **1 grön öronsug** (för att suga bort bedövningssalvan innan injektionen)
5. **1 ampull Gensumycin (Gentamicin) 40mg/ml 2ml/ampull, 1,5 ml används + 1 ampull/flaska Natriumbikarbonat 50mg/ml, 0,5 ml används**
6. **2 rosa uppdragskanyler**
7. Intratympanal nål 27G 0,4 x 90 mm (REF 6066590).
8. *Eller* 1 svart kanyl/intramuskulärnål, 22G 0,70 c 50mm (REF 900598)

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Öron- näs- hals- käkkirurgi

Innehållsansvar: Åsa Lenberg, (asale), Överläkare

Granskad av: Åsa Lenberg, (asale), Överläkare

Godkänd av: Christin Apelman Lacandler, (chrap1), Enhetschef

Dokument-ID: NU10103-1961048382-145

Version: 1.0

Giltig från: 2025-11-18

Giltig till: 2027-11-18