


Gäller för: Öron- näs- hals- och käkkirurgi gemensam
Innehållsansvar: Linn Ekekrantz Remnol, (linek21), Sjuksköterska
Godkänd av: Christin Apelman Lacandler, (chrap1), Enhetschef

Giltig från: 2025-10-03

Giltig till: 2027-10-03

Trakealkanylbyte - uppdukning



1. **Trakealkanyl** – Kontrollera vilken sort och storlek patienten ska ha genom att titta i Melior. Ta fram rätt trakealkanyl och lägg fram förpackningen. Lägg fram innerkanyl. Kontrollera att kuffen är hel innan applicering
2. **Sugslang och sugkateter** – **Vit eller grön** (Ska vara kopplat innan start av byte).
3. **Kuffmätare** med **mellanslang** (mellanslang är inte med på bild)
4. 1-2st **10ml sprutor** – Till i och ur- kuffning.
5. **Xylocaingel** – Lägg en liten sträng på nedre delen av trakealkanylen som ska ner i hålet.
6. Långt **spekulum** och/eller **Carlenshakar** – Används i fall stomat behöver hållas öppet.
7. **Trakealkompress** – Sätts runt trakealkanylen väl på plats.
8. **Nackband** – Fästs i trakealkanylen, var gärna två personer så trakealkanylen inte åker ur.
9. Vissa trakealkanyler kuffas upp med sterilt vatten andra med luft. Kontrollera vad du ska kuffa med innan bytet.

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

OBS!

För **tydlighet i bilden** används grön duk och alla förpackningar är öppnade. Öppna **inte** förpackningar förrän du vet att de ska användas. Duka vagn med blått tunt underlag och lägg över ett ifall vagnen är förberedd en tid innan.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Öron- näs- hals- och käkkirurgi gemensam

Innehållsansvar: Linn Ekekrantz Remnol, (linek21),
Sjuksköterska

Godkänd av: Christin Apelman Lacandler, (chrap1), Enhetschef

Dokument-ID: NU10103-2096068290-12

Version: 7.0

Giltig från: 2025-10-03

Giltig till: 2027-10-03