


Gäller för: Öron- näs- hals- och käkkirurgi gemensam
Innehållsansvar: Linn Ekekrantz Remnol, (linek21), Sjuksköterska
Godkänd av: Christin Apelman Lacandler, (chrap1), Enhetschef

Giltig från: 2025-10-07

Giltig till: 2027-10-07

Näsblödning – uppdukning och tillvägagångsätt



Förbered med följande innan en patient med näsblödning kommer in i rummet.

1. Sprutfat med bomullstussar – Två tussar kan man hålla Lidokain-Nafazolin på för bedövning (5) och två tussar används med olja (2) efter åtgärd.
2. Olja – Används på bomullstussar. Stoppas i näsan efter blödningen har avstannat.
3. Kräkpåse – Låt patienten hålla denna under hakan själv.
4. Nässug – Kopplas innan patienten tas in på rummet.
5. Lidokain-Nafazolin APL – För bedövning och blodstillning.
6. Cellstoff – Ge patienten några och ha ett par inom räckhåll.

Tillvägagångssätt.

- Sätt förkläde på patienten.
- Be patienten snyta sig.
- Förbered bomullstussar (1) med Lidokain-Nafazolin (5) till blödande näsborre (bedövning/blodstillar).
- Koppla nässug (4).
- Kräkpåse och cellstoff ges till patienten.
- Ta fram näsblödningsbrickan. Önh-mott och avdelningen har olika näsblödningsbrickor.
- Plocka fram nödvändig utrustning till diatermin och även silvernitrattstickor.
- Vid bakre näsblödning finns två alternativ.
 - Rapid-Rhino. Doppas i steriltvatten före insättande, se bruksanvisning.
 - Kateterslang - KAD. Om KAD sätts så ska patienten SKRIVAS in på avdelning. Plocka fram följande saker om KAD ska sättas: Kuffspruta, KAD-klämma, 2cm breda tamponader ca 40cm som är indränkta i Terracortil och kompresser som är klippta med slits.
- Efter behandling sätts en bomullstuss med olja in i den näsborren som blött/åtgärdats, dock inte vid KAD insättning.

Näsblödningslåda – ÖNH-mottagningen



1. Rûsch kateter – 1st storlek 12, 1st storlek 14.
2. Spongostan – klipp i lagom bit och håll över vatten eller Statraxen (3).
3. Statraxen 100mg/ml – blodstillande läkemedel.
4. Rapid-Rhino.
5. Tamponader.
6. Kompresser.
7. Silvernitrattstickor.
8. Näsförband.
9. 10 ml sprutor, tejp och sterilvatten (till kuffen på KAD)
10. Terracortil med Polymyxin B droppar.
11. Kateterklämma.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Öron- näs- hals- och käkkirurgi gemensam

Innehållsansvar: Linn Ekekrantz Remnol, (linek21),
Sjuksköterska

Godkänd av: Christin Apelman Lacandler, (chrap1), Enhetschef

Dokument-ID: NU10103-2096068290-36

Version: 9.0

Giltig från: 2025-10-07

Giltig till: 2027-10-07