
Gäller för: Öron- näs- hals- och käkkirurgi gemensam
Giltig från: 2026-09-03
Innehållsansvar: Linn Ekekrantz Remnol, (linek21), Sjuksköterska
Giltig till: 2028-09-03
Granskad av: Linn Ekekrantz Remnol, (linek21), Sjuksköterska
Godkänd av: Christin Apelman Lacandler, (chrap1), Enhetschef

Paracentes med rörsättning



1. **Fenol** – Bedövning. Används mycket **försiktigt**! Sätt på kork direkt efter användning.
2. **Mugg** – För vatten – doppa rörpåföraren (9) i vatten innan röret (9) sätts på. Detta för att röret ska glida av inne i trumhinnan och inte fastna på rörpåföraren.
3. **Ståltops** – Doppas i Fenol.
4. **Myringotomiskalpell** – Sätts på sughandstycke (7).
5. **Svart kanyl** – Sätts på sughandstycke (7) istället för myrigotomiskalpellen (5).
6. **Sughandstycke** – används som handtag till antingen (5) eller (6), läkarens val.
7. **Vit öron sug –** För att suga bort Fenol eller vax som inte sugits bort innan.
8. **Rör** – Träs på rörpåföraren (9).
9. **Rörpåförare –** Doppa spetsen i vatten innan röret (8) sätts på.

OBS!
För **tydlighet i bilden** används grön duk och alla förpackningar är öppnade. Öppna **inte** förpackningar förrän du vet att de ska användas. Duka vagn med blått tunt underlag och lägg över ett ifall vagnen är förberedd en tid innan.

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Öron- näs- hals- och käkkirurgi gemensam

Innehållsansvar: Linn Ekekrantz Remnol, (linek21), Sjuksköterska

Granskad av: Linn Ekekrantz Remnol, (linek21), Sjuksköterska

Godkänd av: Christin Apelman Lacandler, (chrap1), Enhetschef

Dokument-ID: NU10103-2096068290-46

Version: 6.0

Giltig från: 2026-09-03

Giltig till: 2028-09-03