
Gäller för: Öron- näs- hals- och käkkirurgi gemensam
Innehållsansvar: Linn Ekekrantz Remnol, (linek21), Sjuksköterska
Granskad av: Linn Ekekrantz Remnol, (linek21), Sjuksköterska
Godkänd av: Christin Apelman Lacandler, (chrap1), Enhetschef

Giltig från: 2026-09-03
Giltig till: 2028-09-03

# Byte av PEG – Perkutan Endoskopisk Gastrostomi




1. **PEG** – Välj rätt storlek genom att titta i Melior. Testa alltid kuffen innan den tas i bruk.
2. **10ml spruta + Mätsticka** - behövs **endast** vid mätning inför byte till knapp.
3. **Xylocaingel** – Lägg en sträng på den del av PEG:en som ska ner i hålet.
4. **Non-woven kompress** – Klipps ur så den ska passa runt PEG (**endast vid behov,** bara om patienten specifikt önskar detta)
5. **Kateterklämma** – som extra stängning av gastrotuben.
6. **2st 10ml sprutor** till i-kuffning och ur-kuffning.
7. **Sterilt vatten** – Används till att kuffa upp med, 7-10ml.
8. **Kompress** – att torka med vid behov, ev. med vatten.

**OBS!**
För **tydlighet i bilden** används grön duk och alla förpackningar är öppnade. Öppna **inte** förpackningar förrän du vet att de ska användas. Duka vagn med blått tunt underlag och lägg över ett ifall vagnen är förberedd en tid innan.

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

# Information om handlingen

**Handlingstyp**: Rutin

**Gäller för**: Öron- näs- hals- och käkkirurgi gemensam

**Innehållsansvar**: Linn Ekekrantz Remnol, (linek21), Sjuksköterska

**Granskad av:** Linn Ekekrantz Remnol, (linek21), Sjuksköterska

**Godkänd av:** Christin Apelman Lacandler, (chrap1), Enhetschef

**Dokument-ID**: NU10103-2096068290-50

**Version**: 5.0

**Giltig från:** 2026-09-03

**Giltig till:** 2028-09-03