

Gäller för: Mammografienhet Uddevalla sjukhus
Innehållsansvar: Carina Bjelkengren, (carbj), Sjuksköterska
Godkänd av: Maria Edegran, (mared2), Överläkare

Giltig från: 2025-10-10

Giltig till: 2027-10-10

Galaktografi/Duktografi

Syfte

Metodbeskrivning för undersökning på Mammografiavdelningen, NU-sjukvården.

Förändringar sedan föregående version

Reviderad, endast smärre förändringar.

Inför undersökningen

Indikation	Diagnostisera förändringar och utesluta malignitet.
Undersökningskod	66300 Galaktografi
Strålskydd	Se kapitel 4.2 och 5.6 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning
Arbetsplats	Siemens Mammomat Revelation
Patientförberedelser	Fråga patienten om eventuell överkänslighet mot kontrast.
Kompressionsplatta	18 x 24, 24 x 30 Softcomp 20 x 26, 12 x 24 Förstoringsplatta öppen
Förberedelser i PACS och SYNGO	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollera patient-ID och att rätt undersökningskort är valt i PACS.• Starta och signera undersökningen i PACS.• Skriv ansvarig läkares signatur i PACS.• Markera samma patient i SYNGO.
Läkemedel	Omnipaque 180 mg/ml – enligt ordination

Material

- Op-handduk
- Duktografiset (duktografinål, mellanstycke)
- Tork
- Klorhexidinsprit 5 mg/ml
- Spruta 1 ml
- Kanyl rosa 1,2 x 50 mm (uppdrag)
- Hudvänlig tape
- Handskar
- God belysning – operationslampa
- Cavilon
- Förstöringsglas

Undersökning

Bildtagning

Förstöringsbild, CC, ML och komplettera ML om det inte finns tidigare på aktuell sida.

Tillvägagångssätt

1. Dra upp kontrast i 1 ml-sprutan.
2. Spola igenom kateter och duktografinål med kontrast.
OBS! Ingen luft kvar i slang/kanyl.
3. Patienten sitter på en stol, alternativt i ryggläge på en brits.
4. Tvätta bröstet/mamillen med Klorhexidinsprit 5 mg/ml
5. Läkaren/delegerad sjuksköterska för in duktografinålen i mjölkgången som det kommer vätska från. Beskriv i intervju-rutan var mjölkgången är lokaliserad på mamillen, om det går lätt/svårt att spruta in kontrast och om kontrasten rinner brevid
6. Nålen kan eventuellt sitta kvar i mamillen – fäst med tejp vid bildtagning alt stryk på Cavilon.
7. Sjuksköterskan sprutar kontrasten försiktigt.
8. Bildtagning direkt – komprimera inte för hårt.
9. När bilderna är godkända – ta bort nålen.

Efter undersökning

Dokumentation i PACS

- Fyll i [Läkemedel](#) i undersökningskortet.
- Stoppa undersökningen i PACS.

Eftervård

Ingen.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Mammografienhet Uddevalla sjukhus

Innehållsansvar: Carina Bjelkengren, (carbj), Sjuksköterska

Godkänd av: Maria Edegran, (mared2), Överläkare

Dokument-ID: NU10129-1655924590-21

Version: 5.0

Giltig från: 2025-10-10

Giltig till: 2027-10-10