

Gäller för: Mammografienhet Uddevalla sjukhus
Innehållsansvar: Maria Edegran, (mared2), Överläkare
Godkänd av: Maria Edegran, (mared2), Överläkare

Giltig från: 2024-08-13

Giltig till: 2026-08-13

Översikt mammografiundersökningar, lathund

Syfte

Lathund för sjuksköterskor.

Förändringar sedan föregående version

Reviderad under rubrik klinisk undersökning, kvinna

Screening

- Kvinnor 40-74 år.
- 2-bilds mammografi; CC + MLO bilateralt.
- Om implantat tas också pushback CC + MLO bilateralt.
- 2-bilds mammografi; CC + MLO bilateralt även på bröstcancerkontroller och hereditetskontroller i screeningen.
- Om kvinnan gjort mammografi inom 6 månader ska inte screening utföras.
- Kvinnan får boka om sin screening upp till 3 månader.
- Om ny knöl eller knöl som ökat i storlek, sätts en markör på knölen på MLO-bilden.

Gravida och ammande kvinnor i screeningen

Graviditet utgör inget hinder för mammografiundersökning i strålskyddshänseende eftersom livmodern inte befinner sig inom det primära strålfältet, och den spridda strålningen är av sådan karaktär att stråldosen till fostret är försumbar jämfört med den naturliga bakgrundsstrålningen. Det är kvinnans tillstånd som får avgöra om undersökningen tekniskt går att genomföra månaden/månaderna innan beräknad förlossning.

Amning är i sig inget hinder för att utföra mammografiscreening. Undersökningen ska föregås av att bröstet först ammas ur.

Om kvinnan på grund av sin situation vill avvakta med undersökningen ska hon informeras om att hon kan göra undersökningen inom tre månader. Ambitionen är att screeningtillfället inte senareläggs mer än tre månader.

Klinisk undersökning, kvinna

Mammografi utförd inom 6 månader

- Undersökning efter ordination av röntgenläkare.

Under 25 år

- Börja med ultraljud. Om röntgenläkaren efter ultraljudsundersökningen begär mammografi görs CC + MLO bilateralt.
- Vid hereditetskontroll remitterad från bröstkirurg görs mammografi CC + MLO bilateralt före ultraljudsundersökningen.

Över 25 år

- Mammografi CC + MLO bilateralt.
- Om implantat tas också pushback CC + MLO bilateralt.
- Om knöl också en ML på den aktuella sidan med markör på knölen.

Gravid

- Börja med ultraljud.
- Mammografi CC + MLO bilateralt om röntgenläkaren begär det efter ultraljud.

Amning

- Be kvinnan amma ur innan undersökningen.

Klinisk undersökning, man

- Under 20 år: Endast ultraljud.
- Över 20 år: MLO bilateralt.
- Ytterligare bildtagning om röntgenläkare begär det.

Kontroll under pågående neoadjuvant behandling

- Första kontrollen efter inläggning av markör tas 3-bilds mammografi på den aktuella sidan; CC, MLO, ML, följande kontroller 2 bilder CC + MLO.

Postoperativ årskontroll

- 2-bilds mammografi; CC + MLO bilateralt.
- Om implantat tas också pushback CC + MLO bilateralt.
- Mastektomi: 2 bilder, CC + MLO, på det kvarvarande bröstet.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Mammografienhet Uddevalla sjukhus

Innehållsansvar: Maria Edegran, (mared2), Överläkare

Godkänd av: Maria Edegran, (mared2), Överläkare

Dokument-ID: NU10129-1655924590-80

Version: 11.0

Giltig från: 2024-08-13

Giltig till: 2026-08-13