

Personnummer.....

Namn.....

Läkemedel och ordinationer för patienter vid livets slut med stor risk för akut blödning, kramp eller andningsvägshinder

Morfin inj 10 mg/ml

5-15 mg (0,5-1,5 ml) sc mot smärta.

Kan upprepas.

Robinul inj 0,2 mg/ml

0,1-0,2 mg (0,5-1 ml) sc vid plågsam rossling i terminalt skede.

Kan ges 4 ggr per dygn.

Haldol inj 5 mg/ml

1 mg (0,2 ml) sc vid illamående.

Kan ges 3 ggr/dygn.

Midazolam 5 mg/ml

Ges mot oro/ångest/agitation, alternativt vid kramp 1 mg (0,2 ml) subkutant med utvärdering efter cirka 20 minuter. Vid otillräcklig effekt upprepas dosen följt av ny utvärdering och ev. nya doser. När eftersträvad effekt uppnås noteras den sammanlagda dos som är given. Den dosen kan sedan användas som riktvärde för förnyad behandling. 2 – 5 mg räcker oftast.

Vid akut blödning, kramp eller akut andningsvägshinder ges

- **Buccolam munhålelösning 10 mg** mellan kinden och tänderna eller **Midazolam/Dormicum 5 mg/ml, 2 ml under tungan** samt **Morfin 10 mg/ml, 1 ml s.c.**
- Ovanstående kan upprepas vid behov efter 10 – 15 minuter

Omvårdnadsåtgärder vid akut blödning, epileptisk kramp eller akut andningsvägshinder

- Om kräkning: lägg patienten i sidoläge
- Lindra ångesten genom närvaro
- Tillkalla sjuksköterska
- Dämpa belysningen
- Lägg ut mörka dukar/handdukar eller lakan
- I öppenvård: Tillkalla **INTE** ambulans
- Symtomlindra med läkemedel enligt ovan

Datum Ordinerande läkare Ansvarig enhet.....