

Njurbiopsi checklista

Förändringar sedan föregående version

Mindre spåkliga justeringar i denna revision.

Bakgrund och syfte

Att skapa en tydlig och lättförståelig arbetssätt som en del av kvalitetsarbetet runt njurbiopsi. Att förtydliga vikten av samsyn gällande avdelningens rutiner.

Undersökningsdag: _____

Patientetikett

Förberedelser

☐ Inskrivningssamtal om patient kommer hemifrån.

Informationssamtal.

☐ NEWS. Observera blodtryck får ej överstiga (150/85 mmHg)

☐ ID- kontroll och ID-band sätts på.

☐ Sätt PVK

- ☐ Kontrollera att prover är tagna och signerade. Om blodprover ej är tagna på vårdcentralen skall följande prover tas: Blodstatus, elstatus, PK, APTT.
- ☐ Urinsticka
- ☐ BAS- test
- ☐ Blodgruppering (om inte gammal finns)
- ☐ Skriv ut lab- etiketter (ska skickas med till röntgen)
- ☐ Premedicinering ordinerar av läkare. [enligt rutin Q.Di 710](#)
- ☐ Förberedd med transportbox och lägg remissen i boxen (i mån av tid)
- ☐ Kontakta transplantationslaboratoriet patologen och meddela ankomstdagen för biopsi (031- 3426674)

Biopsidagen

- ☐ Fasta från klockan 00:00
- ☐ Morgonmediciner ska ges klockan 06:00
- ☐ Patientskjorta
- ☐ Blodtrycket kontroll (Obs får inte överstiga 150/85. Om kvarstående förhöjt blodtryck >150/85 efter en timme kontakta njurläkare)
- ☐ **Ge premedicinering enligt ordination 1 timme före biopsi:**
- T. Stesolid 5 mg
 - T. Paracetamol 1000 mg
 - Om kreatinin >150 eller GFR <45 ska injektion Octostim (ges subkutant) ordinerar.

Tas med till röntgen

- Transportbox avsedd för njurbiopsi märkt med adressen till Patologen, Gula stråket, Sahlgrenska Universitetssjukhuset AKUT.
- PAD- remiss läggs i transportboxen
- Lab- etiketter till preparatburk (preparatburk tillhanda från röntgen)

Efter biopsi

☐ Transportboxen med preparatet lämnas till Kemlab.

☐ Observation av blodtryck, puls, stickställe (var god se observation efter biopsi)

☐ Får dricka först efter 1 timme efter biopsi (rikligt med dryck).

Klockan _____

☐ Får äta 4 timmar efter biopsin om inga komplikationer tillstött.

Fasta till klockan _____

☐ Strikt sängläge på sticksidan första timmen för att minska blödningsrisk, följt av 3 timmar strikt sängläge på rygg. Sängläge till klockan _____

☐ Huvudändan får höjas 40 grader två timmar efter biopsin.

☐ Mellan 4:e och 7:e timmen gäller sängläge och patienten får gå upp vid behov (men helst inte).

Efter 7 timmars observation och förutsatt att inga komplikationer uppstått kan patienten gå hem. Vid osäkerhet om patientens hemgång kontaktas njurjouren.

Observation efter biopsi

☐ Blodtryck och puls var 15:e minut i 2 timmar. Därefter var 30:e minut tills blodtrycket har varit stabilt i 2 timmar. Använd observationsjournal

☐ Kontroll av allmäntillstånd och stickställe med samma frekvens som blodtryckskontrollerna.

☐ Kontrollera urinens färg. Vid påtaglig makrohematuri kontaktas njurläkare. Kan bli aktuellt med hematuri- KAD.

Vid misstanke om blödning kontakta dialysläkare. Efter klockan 16:00 kontaktas njurjouren. Kontrollera akut Hb. Akut ultraljud (ring röntgenjour)

Symtom som kan ge misstanke om blödning: smärta, illamående, blekhet, takykardi, makroskopisk hematuri, urinträningar, hb- sänkning (särskilt >20g/l), blodtrycksfall (< 100/70 mmHg) eller kreatininstegring