

Vårdhygeniska riskfaktorer

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN
NU-SJUKVÅRDEN

Smittriskbedömning viktig del i patientsäkerhetsarbetet



HUD



- Sår

Ökad smittrisk vid irriterade/rodnade, infekterade, vätskande, svårläkta eller stora omläggningskrävande sår.

- Skadad hud/Eksem

Skadad hud och konstgjorda kroppsöppningar drar lättare till sig mikroorganismer från omgivningen som även får lättare att fästa


- Dränage/Kärlkatetrar
- Abscess/Böld

HUD

Omvårdnadsåtgärder:

- Bör placeras på enkelrum eller med så få medpatienter som möjligt.
- Vid vistelse i allmänna utrymmen ska såren vara täckta.
- Vid utbredda sår och känd multiresistent bakterie eller misstanke om detta, se Vårdhygiens hemsida.

Mag-tarm



- Kräkningar
- Diarré
- Inkontinens
- Stomier

Det är stor smittrisk vid alla mag-tarminfektion. Tarmbakterier sprids oavsett om de är infektionsorsakade tarmbesvär eller ej.

Patienten riskerar att sprida tarmbakterier till omgivningen bör ha eget rum med eget hygienutrymme.

Mag-tarm

Omvårdnadsåtgärder:

- Patient får aldrig placeras i korridor eller gemensamma lokaler som dagrum eller väntrum.
- Patient och besökare informeras om vikten av en god handhygien.
- Patient som har akut diarré ska endast genomgå undersökningar/operationer som inte kan vänta av medicinska skäl. Kontakta alltid mottagande enhet så att patienten tas emot direkt

Personal

- Handtvätt med tvål och vatten ska alltid utföras före handdesinfektion efter vård av patient med diarré.
- Personal som vårdar patient med diarré ska inte hantera livsmedel under innevarande arbetspass.

Urin

- Kateter
- Inkontinens



Luftvägar



- Hosta

När en person hostar sprids alltid droppar som innehåller bakterier och virus, även om patienten inte har en aktiv infektion

- Snuva
- Nysningar

Luftvägar

- Vid misstanke om mer smittsam luftvägsinfektion

influensa, kikhosta eller tuberkulos rekommenderas kontakt med infektionsjour innan inläggning. Rum avsett för luftburen smitta ska användas.

Vid hosta gäller

- Undvik att vårda patient som har hosta tillsammans med andra patienter.
- Inte vistas i gemensamma lokaler som dagrum eller väntrum utan smittriskbedömning.
- Patienten informeras om god hosthygien, det vill säga hosta i armveck eller i näsduk som slängs direkt. ***Noggrann handhygien***

Personal

- Personal som arbetar nära hostande patienter ska alltid skydda sig för droppsmitta. Det är viktigt att använda visir som går nedanför hakan.
- Vid misstanke om luftburen smitta används även andningsskydd, FFP3.
- Vid sugning och inhalationsbehandling ska visir alltid användas

Nedsatt kognitiv förmåga



- Svårigheter att förstå och följa instruktioner
- Demens, eller barn som stoppar saker i munnen.



Tillsammans kan vi göra skillnad

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN
NU-SJUKVÅRDEN