

Propycilbehandling vid förhöjd ämnesomsättning

Personnr: _____

Namn: _____

Vid medicinsk behandling av förhöjd ämnesomsättning bromsar vi kraftigt sköldkörtelns hormonproduktion med Propycil och ger samtidigt Levaxin (ämnesomsättningshormon) för att få en lagom ämnesomsättning.

Behandling

- Påbörja behandling med Propycil 50 mg ___ tabletter 3 ggr dagligen.
- 2 veckor efter Propycilstart börjar du med t Levaxin 100 mikrogram 0,5 t dagligen.
- 4 veckor efter Propycilstart börjar du med t Levaxin 100 mikrogram 1 t dagligen, fortsätt hela tiden med Propycil.

__ veckor efter behandlingsstart med Propycil bör du ta ett blodprov. Ta med lab-remiss till klinisk kemi på ditt sjukhus eller till din vårdcentral.

Blodprov behöver sedan tas var 8 – 12:e vecka under pågående behandling om vi inte säger något annat. Vi hör av oss efter provsvar via telefonkontakt eller via brev. Har du inte fått besked någon vecka efter provtagning bör du höra av dig till endokrinmottagningen för besked:

NÄL: Telefon 010 – 435 48 40 måndag – fredag 09:15 – 11:15

Uddevalla: Telefon 010 – 435 49 20 måndag – fredag 09:15 – 11:15

Du kommer att kallas för ett återbesök om cirka 1 månad.

Vid Graves sjukdom kan man få ögonpåverkan. Hör därför av dig om du får sådana besvär.

OBSERVERA! Tänk på Propycilbiverkningsinformationen (var god se separat informationsblad). Det är också mycket viktigt att undvika att bli gravid under pågående Propycilbehandling och en längre tid efter avslutad behandling.