

## Patientinformation



### **Vad är SLT?**

SLT står för **S**elective **L**aser **T**rabeculoplasty och är en laserbehandling av det så kallade trabekelverket. Detta är ett dräneringssystem för vätska i ögat, som inte släpper ut den normala mängden vatten ur ögat om man har grön starr.

### **Varför görs en SLT?**

En SLT görs för att sänka ögontrycket som är den största riskfaktorn för att få glaukom eller försämrat glaukom. Man kan göra en SLT för att slippa droppa eller för att sänka trycket utöver den trycksänkning man redan har med droppar.

### **Hur lång tid tar en SLT?**

Själva laserbehandlingen tar normalt inte längre än 10 minuter men det kan variera beroende på ett antal olika faktorer. Med förberedningstid, dropptid och väntetid tills droppar har fått verkan brukar en SLT ta lika lång tid som ett vanligt läkarbesök.

### **Gör en laserbehandling ont?**

Man sätter en lins på ögat som är lite större än pelotten man använder för tryckmätning. Om man inte har besvär med tryckmätning hos ögonläkare brukar det inte vara något problem att sätta linsen på ögat. Själva laserbehandlingen brukar man inte känna alls. I enstaka fall kan man uppleva en lätt spänningskänsla.

### **Ser jag sämre efter lasern?**

Under en kort tid, vanligtvis mindre än en timme, kan man se suddigt eftersom en kontaktlins användes.

### **Kan jag köra bil efter laserbehandlingen?**

Man brukar få en droppe som drar ihop pupillen. Man får köra bil men det kan hända att man ser lite sämre åt sidorna under några timmar efter laserbehandlingen. Känner man sig osäker är det säkrast att avvakta ett par timmar efter behandlingen.

### **Kan man upprepa behandlingen?**

Man kan upprepa en SLT-behandling flera gånger, men effekten kan bli mindre. Exakt hur ofta man kan behandla är ej känt eftersom det varierar stort mellan patienterna.

### **Ska man ha droppar efter laserbehandlingen?**

Om vi behandlar båda ögonen skriver vi ibland ett recept för droppar som minskar en möjlig inflammation och dem ska man använda i fem dagar. Går behandlingen enkelt att utföra och görs endast på ett öga, brukar vi inte skriva ut några extra droppar. Normalt ska man fortsätta med de trycksänkande ögondroppar som man redan använder. Eventuellt kan man minska på dropparna efter ett kontrollbesök och läkarbedömning.